

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u zasadu voća, vinove loze, jagode i povrća (pre rasađivanja)

Aktivna materija: Napropamid 450 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način primene:


Preparat se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova pre njihovog nicanja, tretiranjem (prskanjem) zemljišta pre setve (sadnje, rasađivanja) useva. Posle prskanja, neophodno je uraditi plitku inkorporaciju (unošenje) u zemljište, na dubini 2-5 cm. Nakon primene, poželjna je kiša ili navodnjavanje.

Primena:

DEVRIKOL 45-F se primenjuje u:

- **zasadu jagode**, u količini 3-6 l/ha (30-60 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u vreme mirovanja vegetacije, a pre kretanja korova, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm
- **paprici i paradajzu**, u količini od 2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm (ne primenjuje se kod ranih sorti)
- **kelju, kupusu i karfiolu** u količini: 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm
- **duvanu**, 3 l/ha (30 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u lejama za proizvodnju rasada, pre setve, ili, 2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u polju pre rasađivanja, uz inkorporaciju na 2-5 cm dubine
- **zasadima voća i vinove loze**, 7-10 l/ha (70-100 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u proleće, u zasadima starijim od godinu dana, pre nicanja korova ili posle obrade zemljišta, uz plitku inkorporaciju od 2-5 cm dubine.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).



Spektar delovanja

Vrste korova koje **dobro suzbija** u količinama primene od **2,5-6 l/ha**: svračica crvena (*Digitaria sanguinalis*), proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*), muhari (*Setaria spp*), divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), dvozub obični (*Bidens tripartita*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), tušt obični (*Portulaca oleracea*), lobođa obična (*Atriplex patula*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), konica obična (*Galinsoga parviflora*).

Vrste korova koje **dobro suzbija** u količinama primene od **7-10 l/ha**, a **zadovoljavajuće** u količini **2,5-6 l/ha**:

livadarka jednogodišnja (*Poa annua*), muhar zeleni (*Setaria viridis*), divlja salata (*Lactuca serriola*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), dvornik obični (*Polygonum persicaria*).

Vrste korova koje **slabo suzbija**: pirevina obična (*Agropyrum repens*), divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*), vrste iz familije *Brassicaceae*, mrtva kopriva (*Lamium purpureum*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), palamida njivska (*Cirsium arvense*), poponac njivski (*Convolvulus arvensis*).

Mešanje sa drugim preparatima: DEVRINOL 45-F se može mešati sa preparatima na bazi flurohloridona u zasadima voća, dok se u usevima povrća može mešati sa preparatima na bazi trifluralina.

Plodored:

16 meseci posle primene može se sejati ovas

12 meseci posle primene mogu se sejati: pšenica, ječam, raž, kukuruz, sirak, šećerna repa, stočna repa i salata

Narednog proleća nakon primene mogu se sejati: kupusnjače, paprika, paradajz, duvan, uljana repica, krompir, pasulj, suncokret

Karenca:

70 dana za kelj, kupus, karfiol

OVP za vinovu lozu, voće, jagodu, duvan, papriku, paradajz

NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (laka i peskovita zemljišta sa < 1% humusa), na tresetnim i polutresetnim zemljištima (> 10 % humusa), na izrazito suvim i izrazito vlažnim zemljištima.

Maksimalan broj tretiranja: Jednom na istoj parceli, tokom vegetacije



Agrimatco

Pakovanje: 1l, 100 ml