

Programi zaštite

| PŠENICA | | | |
|---|---|---|---|
| Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Količina primene |
| Od sredine boko- renja do pojave drugog kolenca | abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatu- la, pomoćnica, palamida, divlja papri- ka, pepeljuga, gorušica, veronika... | Dicopur Top 464 SL | 1 l/ha |
| Pojava lista zastavičara | prilepača (Galium), poponac, divlja kupina, pomoćnica, tatula, ambrozi- ja, čičak, abutilon, palamida... | Starane 250 + Mezzo 60 WG + Inex (okvašivač) | 0,4 l/ha + 10 g/ha + 0,2 l/ha |
| | bolesti lista i stabla (pepelnica, rđa, pegavost) | Porto + Silwet L 77 | 0,5 l/ha + 0,05 – 0,1 l/ha |
| | larve žitne pijavice (Lema) | Kaiso WG ili Pinto | 150 g/ha ili 150 ml/ha |
| Početak cvetanja | Fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla | Porto + Topsin + Silwet L 77 | 0,5 l/ha + 300 g/ha + 0,05 – 0,1 l/ha |
| Suzbijanje korova na strništu | Totalno suzbijanje svih korova | Kyleo | 3-5 l/ha |

| KUKURUZ | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Količina primene |
| Posle setve a pre nicanja kukuruza | semenski sirak, muhar, štir, pepeljuga,... | Tender | 1,4 l/ha |
| Posle nicanja od 2 – 5 lista kukuruza | abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatula, pomoćnica, palamida, divlja paprika, pepeljuga, gorušica... | Dicopur Top 464 SL | 1 l/ha |
| Posle nicanja od 2 – 6 lista kukuruza | divlji sirak iz rizoma, muhar | Astral 40 OD | 1 – 1,25 l/ha |
| Posle nicanja do 8 lista kukuruza | abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatu- la, pomoćnica, palamida, dvornici, pepeljuga, gorušica... | Metto + Inex | 0,15 – 0,25 l/ha + 0,2 l/ha |
| 7-10 dana nakon max leta leptira | Kukuruzni plamenac | Ampligo | 0,2 – 0,25 l/ha |

| SOJA | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Količina primene |
| Posle setve a pre nicanja | semenski sirak, muhar, štir, pepeljuga, gorušica, ambrozija, tatula, abutilon, dvornici, loboda... | Lord 70 WDG + Tender | 0,3 – 0,4 kg/ha + 1,4 l/ha |
| Posle nicanja soje (soja u fazi od 1 – 3 troliske) | divlji sirak iz rizoma, pirevina | Fargo | 1,2 – 2 l/ha |



SUNCOKRET

| Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Količina primene |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|
| Posle setve a pre nicanja | semenski sirak, muhar, štir, pepeljuga | Tender | 1,4 l/ha |
| Folijarno suzbijanje korova | divlji sirak iz rizoma, plevina | Fargo | 1,2 – 2 l/ha |

ŠEĆERNA REPA

| Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Količina primene |
|--|---|---|----------------------------------|
| Folijarno suzbijanje korova | palamida, ambrozija, čičak, samonikli suncokret... | Lontrel 300 | 0,2 – 0,3 l/ha |
| | abutilon, štir, dvornici, gorušica, pomoćnica... | Apex 50 WG + Inex | 30 g/ha + 0,1 l/ha |
| | vilina kosica | Kerb 50 WP | 4 kg/ha |
| | divlji sirak iz rizoma, plevina | Fargo | 1,2 – 2 l/ha |
| Preventivno ili po pojavi prvih simptoma | siva pegavost lista – cercospora | Azbany 250 SC + Silwet L 77 | 0,8 l/ha + 0,05 – 0,1 l/ha |
| Suzbijanje insekata | repina pipa, lisne sovce i lisne vaši | Anthocid D | 1,5 – 2 l/ha |

KROMPIR

| Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Količina primene |
|--|---|--|--|
| Posle sadnje, a pre nicanja | širokolisni korovi | Lord 700 WDG | 0,75 – 1 kg/ha |
| Posle nicanja (porast krompira do 25 cm) | širokolisni korovi uskolisni korovi (rizomski sirak) plamenjača krompirova zlatica | Lord 700 WDG Fargo Manfil 75 WG Gatgo 20 OD | 0,5 – 0,75 kg/ha 1,2 l/ha 2,5 kg/ha 0,25 l/ha |
| Zatvaranje redova | plamenjača crna pegavost krompirova zlatica | Folio Gold 537,5 SC Gatgo 20 OD | 2,5 l/ha 0,25 l/ha |
| Jasno izdvojene cvasti | plamenjača crna pegavost krompirova zlatica | Folio Gold 537,5 SC Volley 20 SP | 2,5 l/ha 0,25 kg/ha |
| Puno cvetanje | plamenjača krompirova zlatica | Viloksan Volley 20 SP | 3 kg/ha 0,25 kg/ha |
| Precvetavanje | plamenjača krompirova zlatica | Viloksan Volley 20 SP | 3 kg/ha 0,25 kg/ha |
| Nalivanje krtola | plamenjača | Manfil 75 WG | 2,5 kg/ha |

Programi zaštite

| JABUKA | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| Namena | Preparat | Količina primene |
| bakteriozna plamenjača, čađava pegavost i krastavost, plavo prskanje | Nordox 75 WG | 1 – 2 kg/ha |
| čađava pegavost i krastavost | Manfil 75 WG | 2,5 kg/ha |
| | Embrelia 140 SC | 1,5 l/ha |
| | Ambasador | 0,15 l/ha |
| pepelnica | Crystal 250 SC | 0,2 l/ha |
| | Embrelia 140 SC | 1,5 l/ha |
| cvetojed | Pinto | 0,3 l/ha |
| lisne vaši, lisni mineri | Volley 20 SP | 0,25 – 0,4 kg/ha |
| | GatGo 20 OD | 0,3 l/ha |
| | Anthocid D | 1 l/ha |
| crvena voćna grinja, obični paučinar | Armada | 1 l/ha |
| jabukin smotavac | Volley 20 SP | 0,25 – 0,4 kg/ha |
| | Pinto | 0,5 l/ha |
| | Anthocid D | 1,5 l/ha |





VINOVA LOZA

| Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Količina primene |
|--------------------------------|---|--|---|
| Lastari dužine 3 – 10 cm | crna pegavost eriofidne grinje | Manfil 75 WG Armada | 2,5 kg/ha 1 l/ha |
| Lastari dužine 20 – 30 cm | plamenjača pepelnica eriofidne grinje | Viloksan Porto Armada | 3 kg/ha 0,15 l/ha 1 l/ha |
| Pred cvetanje | plamenjača pepelnica | Viloksan Crystal 250 SC | 3 kg/ha 0,2 l/ha |
| Precvetavanje | plamenjača pepelnica cikade | Pergado F Crystal 250 SC Pinto | 2,5 kg/ha 0,2 l/ha 0,35 l/ha |
| Kraj juna | plamenjača pepelnica groždani moljac | Pergado F Porto Volley 20 SP ili Pinto | 2,5 kg/ha 0,15 l/ha 0,25 kg/ha ili 0,3 l/ha |
| Polovina jula | plamenjača pepelnica groždani moljac | Manfil 75 WG Porto Volley 20 SP ili Pinto | 2,5 kg/ha 0,15 l/ha 0,25 kg/ha ili 0,3 l/ha |
| Početak šarka | plamenjača pepelnica | Nordox 75 WG Crystal 250 SC | 1,5 kg/ha 0,2 l/ha |

