

# BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360

*Neselektivni (totalni) herbicid za suzbijanje  
jednogodišnjih i višegodišnjih korova*

**Aktivna materija:** Glifosat 480 g/l u obliku izopropilamino soli  
**Formulacija:** koncentrovani rastvor (SL)

## Osobine i način delovanja

Barclay Gallup Biograde 360 je neselektivni translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i kreće naviše i naniže u biljci. Inhibira sintezu aromatičnih kiselina neophodnih za sintezu proteina. Inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Koristi se za totalno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova.

## Primena:

1. U zasadima jabučastog i koštičavog voća i vinove loze (min. 3 godine starosti), u količini:

2 – 3 l/ha (20–30ml na 100 m<sup>2</sup>), za suzbijanje jednogodišnjih korova iz semena;

4 – 6 l/ha (40–60ml na 100 m<sup>2</sup>), za suzbijanje višegodišnjih korova;

Primenjuje se sa zemlje uz utrošak 150-200 l/ha vode (1,5-2 l na 100 m<sup>2</sup>).

2. Na površinama za pošumljavanje: u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m<sup>2</sup>), tretiranjem pre setve ili posle setve a pre nicanje rasada, primenom sa zemlje i uz upotrebu 250-300 l/ha (2,5-3 l na 100 m<sup>2</sup>) vode;

3. Za suzbijanje izbojaka i izdanaka iz panjeva: tretiranjem panjeva odmah posle seče stabala, sa rastvorom koncentracije 3,5%.

4. Za tretiranje strništa, u količini 2-6 l/ha (20-60 ml na 100 m<sup>2</sup>), primenom sa zemlje i uz upotrebu 150-300 l/ha (1,5-3 l na 100 m<sup>2</sup>) vode;

5. Na livadama i pašnjacima, 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m<sup>2</sup>), za totalno suzbijanje korova, pre zaoravanja; Primenom sa zemlje i uz upotrebu 250-300 l/ha (2,5-3 l na 100 m<sup>2</sup>) vode;





6. Za desikaciju uljane repice: 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m<sup>2</sup>), retiranjem 14 dana pred žetvu, primenom sa zemlje uz utrošak 150-250 l/ha (1,5-2,5 l na 100 m<sup>2</sup>) vode;

7. Na nepoljoprivrednim površinama (suvi kanali, jendeci, železničke pruge): u količini 5-7 l/ha (50-70 ml na 100 m<sup>2</sup>), tretiranjem sa zemlje uz upotrebu vode 250-300 l/ha (2,5-3 l na 100 m<sup>2</sup>).

Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini za navedene namene je dva puta, osim za desikaciju uljane repice i površinama za pošumljavanje, jednom u toku godine.

#### Preporuke i napomene vezane za primenu

- Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu.
- Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.
- Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana od primene



**Agrimatco**

**Pakovanje: 20 l**