

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima

Aktivna materija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata)

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

DELOVANJE: Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i dugog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome ko-
vrđanja.

Starane 250 se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u žitaricama, kukuruzu, voćnjacima, luku, pašnjacima i livadama. Uspešan i profirabilan uzgoj žitarica danas u velikoj meri zavisi od kvalitetnog suzbijanja najopasnijih korova – broćike ili prilepače (*Galium aparine*), jer već jedna biljka prilepače po m² smanjuje prinos za 4 %. Prilepača je termofilni korov (treba visoku sumu temperatura) i dosta kasno se javlja u usevu. U toj fazi razvoja, žitarice su osetljive na primenu mnogih herbicida, dok Starane 250 možemo da primenimo sve do faze lista zastavičara.

Primena:

Strna žita (ozima): u količini 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti do 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti, tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara

Strna žita (jara): u količini 0,6 - 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti ili 0,8 - 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara

Kukuruz: u količini 0,8 l/ha tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova

Luk: u količini 0,8 – 1,2 l/ha tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova. a kada su korovi u fazi 2-5 listova

Zasadi voća i vinove loze: u količini 1,5 – 2 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja)

Vrste korova koje dobro suzbija:

Jednogodišnji širokolisni korovi: Vijušac nijvski (*Bilerdykia convolvulus*), Pepeljuga obična (*Chenopodium album*), Broćika (*Galium aparine*), Dvornik veliki (*Polygonum lapatifolium*), Mišjakinja obična (*Stellaria media*), Ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*), Dimnjača obična (*Fumaria officinalis*), Dvornik ptičiji (*Polygonum aviculare*), Štir obični (*Amaranthus retroflexus*), Pepeljuga srolisna (*Chenopodium hybridum*), Tatula obična (*Datura stramonium*), Pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), Suncokret divlji (*Helianthus annuus*), Mrtva kopriva crvena





(*Lamium purpureum*), Kravljia trava (*Thlaspi arvense*), Čestoslavica persijska (*Veronica persica*), Gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), Lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*)

Višegodišnji širokolisni korovi: Poponac njivski (*Convolvulus arvensis*), Graori (*Lathyrus spp.*), Jabuka vučija (*Aristolochia clematitis*), Pelin crni (*Artemisia vulgaris*), Ivanjsko cveće belo (*Galium mollugo*), Ljutić puzeći (*Ranunculus repens*), Lucerka (*Medicago sativa*), Bokvica velika (*Plantago major*), Detelina bela (*Trifolium repens*), Kopriva obična (*Urtica dioica*) Vodopija obična (*Cichorium intybus*), Nana (*Mentha piperita*), Ljubičica šarena (*Viola tricolor*).

Starane 250 je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na **prilepaču, poponac, divlju kupinu, pomoćnicu, tatulu, ambroziju, čičak i abutilon.**

Pakovanje: 1 l, 200 ml



Agrimatco