

NORDOX 75 WG

F U N G I C I D

Preventivni fungicid za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, plamenjače paradajza, krompira, luka, krastavca i vinove loze, bakterioza na paprici, pasulju, boraniji, leski i orahu, pegavosti i rđe na malini i kupini, i pegavosti lista celera

Aktivna materija: bakar, iz bakar(I)oksida (Cu₂O) 750 g/kg

Formulacija: vodotopive granule (WG), crvenkaste boje

Primena:

- u zasadu **jabuke** za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova u koncentraciji 0,2% (20g u 10 lit vode) u toku mirovanja vegetacije, i 0,1% (10g u 10 lit vode) u vegetaciji do faze „mišije uši“
- u usevu **paradajza, krompira, luka, krastavca i vinove loze** za suzbijanje plamenjače u količini 1 - 1,5 kg/ha (10 – 15 g na 100m²), pre ostvarivanja uslova za zarazu ili najkasnije pri pojavu prvih simptoma
- u usevu **paprike, pasulja i boranije** za suzbijanje bakterijskih oboljenja lista i ploda u koncentraciji od 0,14 do 0,2% uz utrošak 400-600 litara vode
- u usevu **celera** za suzbijanje pegavosti lista celera (*Septoria apicola*) u koncentraciji od 0,14 do 0,2% uz utrošak 300-500 litara vode
- u zasadu **leske i oraha** za suzbijanje bakterioza primenom pre otvaranja pupoljaka ili nakon opadanja lišća u jesen u koncentraciji 0,3 % uz utrošak vode 800-1200 lit/ha
- u zasadu **maline i kupine** za suzbijanje pegavosti izdanaka (*Dydimella*) i rđe u koncentraciji od 0,17 do 0,2% uz utrošak 400-800 litara vode, tretiranjem tokom intenzivnog rasta rodni izdanaka do početka cvetanja rodni grana, kao i nakon berbe.

Osobine i način primene:

- Preparat se posle sušenja rastvora čvrsto vezuje za površinu biljke odnosno lista i jako se teško ispira kišom, što obezbeđuje duže zaštitno delovanje od ostalih bakarnih preparata





- Najsavremeniji fungicid na bazi bakra u obliku vodotopivih granula koji ne stvara prašinu i veoma se lako rastvara u vodi pri pripremi rastvora
- Bakarni fungicid crvene boje koja potiče od visoke koncentracije bakar-oksida koji je najaktivnije jedinjenje bakra
- Primenuje se u znatno manjim količinama od ostalih bakarnih fungicida
- Ovaj preparat ima izuzetnu čistoću aktivne materije i dozvoljen je i u organskoj proizvodnji
- Odlikuje ga visoka selektivnost i produženo rezidualno delovanje

Karenca:

Malina, pasulj i boranija 5 dana; Parika 7 dana
Paradajz i krompir 14 dana; Luk, kupina, leska, orah 21 dan,
Celer 15 dana; Vinova loza 35 dana; Jabuka OVP

Pakovanje: 1 kg, 250 g

