

VILOTRIN 10 WP

 Willowood Limited

Biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni

Aktivna materija: lambda cihalotrin 10%

Formulacija: kvašljivi prašak (**WP**)

Osobine i način delovanja:

- Lambda cihalotrin spada u grupu piretroida.
- Nesistemični (kontaktni) insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Primena:

Preparat VILOTRIN 10 WP koristi se:

- za suzbijanje **crne** (*Blatta orientalis*) i **smeđe** (*Blatella germanica*) **bubašvabe**, tretiranjem zidova i podova prostorija, u količini **50** grama na **10** litara vode uz primenu **40-50 ml/m²**.
- za suzbijanje **žutih mrava** (*Monomorium pharaonis*), tretiranjem zidova i podova prostorija, u količini **50** grama na **10** litara vode uz primenu **40 ml/m²**.
- za suzbijanje **kućne** (*Musca domestica*) i **stajske** (*Stomoxys calcitrans*) **muve**, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala i staja, u količini **50** grama na **10** litara vode uz primenu **50 ml/m²**.
- za suzbijanje **komaraca** tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova objekata, u količini od **50** grama na **10** litara vode uz primenu **50 ml/m²**.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

- Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji ostaje na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan.
- Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono delovanje (ne deluje parama).
- Preparat se koristi isključivo za tretiranje zidova i podova prostorija.
- Preparat ne sme dospeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati direktno prehrambene i poljoprivredne proizvode i stočnu hranu. Preparat se nikako ne sme nanositi direktno na domaće životinje.
- Potpuno očistiti tretirane površine pre primene preparata inače dolazi do smanjene efikasnosti.
- Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina samih površina odnosno podloga.
- Manje količine se koriste na tvrdim i glatkim podlogama a veće na površinama kao malter, cigla, nelakirano drvo i druge neravne podloge. Takođe količina rastvora zavisi i od intenziteta napada štetočina. Za tretiranje jednog kvadratnog metra u zavisnosti od svih ovih uslova trebalo bi koristiti od 30-50 ml rastvora.

Pakovanje: 50 g

