

*Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i kukuruza.*

**Aktivna materija:** Bentazon 480 g/lit  
**Formulacija:** koncentrovani rastvor (SL)

## Osobine i način delovanja

Aladin je kontaktni folijarni herbicid koji deluje isključivo na iznikle korove. Usvaja se preko zelene lisne mase pri čemu je slabo pokretan, te je nužno da masa bude dobro pokrivena preparatom. Usvaja se brzo nakon aplikacije i remeti procese fotosinteze, izazivajući naglu pojavu simptoma hloroze. Nakon nekoliko dana dovodi do potpunog propadanja i sušenja korova.

## Primena:

**Kukuruz:** 3- 4 l/ha kada je kukuruz u fazi 1 do 5 listova, a korovi 2 do 6 listova

**Soja:** 3- 4 l/ha kada je soja u fazi prve do treće troliske, a korovi 2 do 6 listova

## Spektar delovanja

- štir obični (*Amaranthus retroflexus*),
- vidovčica (*Anagalis arvensis*),
- pepeljuga obična (*Chenopodium album*),
- tatula (*Datura stramonium*),
- broćika-lepuša (*Galium aparinae*),
- ptičiji dvornik (*Polygonum aviculare*),
- gorušica (*Sinapis arvensis*),
- pomoćnica (*Solanum nigrum*),
- čičak (*Xanthium strumarium*),
- lubeničarka (*Hibiskus trionum*)





### Preporuke i napomene vezane za primenu

Može biti fitotoksičan u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Ne preporučuje se mešanje sa preparatima za suzbijanje divljeg sirka u soji, jer dovodi do smanjenja efikasnosti. Ukoliko dođe do preoravanja ili privremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka. Ne ograničava plodored. Ne tretirati na temperatura preko 25°C zbog mogućih ožegotina na lisnoj masi.



**Agrimatco**

#### Karenca:

Soja, kukuruz: 63 dana

**Pakovanje: 1 l, 10 l**