

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, posle nicanja šećerne repe i korova.

Aktivna materija: triflusulfuron metil 500 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Apex 50 WG se usvaja uglavnom preko lista, a jednim delom i preko korena. Nakon primene dolazi do prestanka rasta osetljivih korova sa tipičnim simptomima žućenja i odumiranja. Preparat bolje deluje kad je toplo i vlažno vreme, dok suvo i hladno vreme može da uspori delovanje. Apex 50 WG se usvaja u roku od 2 sata nakon primene. Ukoliko padne kiša za manje od 2 sata nakon tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.

Primena:

Faza korova: optimalno vreme za primenu je kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.

Faza useva: Apex® se može primeniti kada je šećerna repa iznikla 70-90%, pa sve do zatvaranja redova repe, a treba ga primeniti kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.

Količina primene: primenjuje se višekratno, maksimalno četiri puta u toku vegetacije, uvek po 30 g/ha i uvek u kombinaciji sa drugim preparatima za suzbijanje korova u šećernoj repi. Da bi se ostvarila dobra folijarna apsorpcija, Apex® u svim kombinacijama treba uvek koristiti uz dodatak okvašivača INEX.

Spektar delovanja:

- lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
- štir obični (Amaranthus retroflexus)
- rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
- konica obična (Galinsoga parviflora),
- dvornik obični (Polygonum persicaria)
- dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
- gorušica poljska (Sinapis arvensis)
- pomoćnica obična (Solanum nigrum)





Abutilon theophrasti

Na ostale širokolisne korove deluje slabije, polovično ili zaustavlja porast.

U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina, značajno se proširuje spektar delovanja na ostale širokolisne korove.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Apex je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na **abutilon**. Optimalno vreme za primenu je kada je abutilon u fazi kotiledona do dva prava lista.

Karenca: obezbeđena vremenom primene u šećernoj repi

Pakovanje: 2 x 30 g (vodotopive kesice)



Agrimatico