

*Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.*

**Aktivna materija:** Dikamba 480 g/lit  
**Formulacija:** Koncentrovani rastvor SL

### **Osobine i način delovanja:**

BASICO je translokacioni herbicid. Aktivna materija dikamba se usvaja pretežno preko lisnog tkiva korova i kreće kroz biljno tkivo. Kao posledica delovanja preparata na korovima se zapažaju deformacije vegetativnih i generativnih organa, narušava se proces razmene materije tj. inhibira proces fotosinteze. Usled ovakvog herbicidnog delovanja ne dolazi do regeneracije i obnavljanja izdanaka iz korenovog sistema

### **Primena:**

#### **U kukuruzu, bez poduseva**

posle kljanja i nicanja korova kada se nalaze u mlađem razvojnog stadijumu (2-6 listova), odnosno kada je kukuruz u fazi do 5 listova (faza 10-15 BBCH skale), u količini od 0,5 – 0,7 l/ha (5 – 7 ml na 100 m<sup>2</sup>).

**Utrošak vode:** 200-400 l/ha (2-4 l/100 100 m<sup>2</sup>).

### **Spektar delovanja:**

štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pelenasta ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), vijušac njivski (*Bytiderdikia convolvulus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*) i boca obična (*Xanthium strumarium*); lipica teofrastova (*Abutilon thophrasti*), tatula obična (*Datura stramonium*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*); njivska palamida (*Cirsium arvense*) i poponac njivski (*Convolvulus arvensis*).

### **Mešanje sa drugim preparatima:**

Može se primenjivati istovremeno sa herbicidima na bazi bromoksilina, terbutilazina, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekoprpa, triklopira

### **Karenca:**

Obezbeđena vremenom primene u kukuruzu

**Pakovanje: 1l, 500 ml**

