

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron metil)

Aktivna materija: Tribenuron metil 750 g/kg
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja

Aktivna materija tribenuron-metil pripada sulfonilureama. Apsorbuje se korenom i folijarno se translocira po svim delovima biljke sprovodnim sudovima ksilema i floema. Zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminokiselina leucina, izoleucina i valina. Simptomi se pojavljuju u vidu hloroza i nekroza meristemskih tkiva, a zatim dolazi do potpune folijarne hloroze i nekroze.

Primena:

U usevu **pšenice** se primenjuje folijarno kada je pšenica u fenofazi od tri lista do pojave 2 kolenca (BBCH 13-32), a korovi od kotiledona do 6 listova u količini primene **15-25 g/ha** + 0,1% okvašivača Inex.

U usevu **suncokreta** (tolerantnog na tribenuron metil) se primenjuje folijarno kada je suncokret u fazi od 2-8 listova (BBCH 12-18) a korovi u fazi 2-4 lista, u količini primene **30 g/ha** + 0,1% okvašivača Inex.


Utrošak vode: 200-400 l/ha

Spektar delovanja

Dobro suzbija s: štir (*Amaranthus retroflexus*), poljski prstenak (*Anthemis arvensis*), smrdušica obična (*Bifora radians*), tarčuzak (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), palamida (*Cirsium arvense*), žavornjak (*Consolida regalis*), mrkva divlja (*Daucus carota*), tatula (*Datura stramonium*), lubeničarka (*Hybiscus trionum*), mrtva kopriva njivska (*Lamium amplexicaule*), bulka (*Papaver rhoeas*), njivski ljutić (*Ranunculus arvensis*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), mišjakinja (*Stellaria media*), ljubičica poljska (*Viola arvensis*) i boca obična (*Xanthium strumarium*);

Slabije suzbija: poponac (*Convolvulus arvensis*), broćiku lepušu (*Galium aparine*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), čestoslavicu poljsku (*Veronica hederifolia*).





Preporuke i napomene vezane za primenu

U normalnom plodoredu nema ograničenja u pogledu useva koji se mogu sejati u sezoni nakon primene sredstva. Ako dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, mogu se sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron-metil.

Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi 2,4 -D i Fluroksipira. Sa drugim preparatima ga ne treba mešati bez prethodne provere.



Agrimatco

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 30 g