

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

Aktivna materija: mankozeb 750 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (**WG**)

Osobine i način delovanja:

- **Manfil 75 WG** je kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
- a.s. mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produženim efektima
- a.s. mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije

Primena:

Preparat **Manfil 75 WG** koristi se u:

- zasadu **jabuke** za suzbijanje prouzrokovača **čadave pegavosti lišća** i **krastavosti plodova** (*Venturia Inaequalis*), u količini **2-2,5 kg/ha** (20-25 g u 10 litara vode).
- zasadu **vinove loze** za suzbijanje prouzrokovača **plamenjače** (*Plasmopara viticola*), u koncentraciji **2-2,5 kg/ha** (20-25 g u 10 litara vode).
- usevu **krompira** za suzbijanje prouzrokovača **plamenjače** (*Phytophthora infestans*), u količini od **2-2,5 kg/ha** (20-25 g/100 m²).

Količina vode: 200-400 l/ha u krompiru,
 1000 l/ha u jabuci i vinovoj lozi.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

- **Manfil 75 WG** primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
- U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8-10 dana
- U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana treba skratiti.
- **Manfil 75 WG** se u roku od dva sata nakon primene vezuje za biljno tkivo.
- Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.





Kompatibilnost:

Manfil 75 WG se može mešati sa preparatima na bazi: bakar oksihlorida, metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida

Manfil 75 WG se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita, insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.

Manfil 75 WG ne treba mešati sa sumporom prilikom poslednjeg tretiranja jer se znatno produžava perzistenost mankozeba

Manfil 75 WG se na istoj površini može upotrebiti 3 puta u toku godine.

Karenca:

Jabuka – 21 dan;
 Krompir – 14 dana;
 stone sorte vinove loze – 21 dan;
 vinske sorte vinove loze – 42 dana

Pakovanje: 1kg ; 250 g ; 25 g

