

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovala pepelnice u zasadima jabuke i vinove loze

Aktivna materija: Miklobutanil 200 g/l
Formulacija: Emulzija ulje u vodi - EW

Osobine i način delovanja

Miclo je sistemik sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Aktivna materija Miklobutanil spada u grupu Triazola i inhibira sintezu ergosterola, sprečavajući razvoj gljive. Posедуje i translaminarno kretanje. Zbog svoje sistemčnosti Miclo brzo prodire u biljku te ga kiša ne može isprati. Preparat se translocira brže i više u akropetalnom nego u bazipetalnom smeru što omogućava zaštitu novonastalih biljnih organa između dva tretmana.

Primena:

Jabuka: za suzbijanje prouzrokovala pepelnice jabuke (*Podosphaera leucotricha*) u konc. 0,015% (1,5 ml u 10 l vode) tretiranjem od fenofaze mišjih ušiju i dalje tokom vegetacije do faze obrazovanja plodova (faze 10-78 BBCH skale)

Vinova loza: za suzbijanje prouzrokovala pepelnice vinove loze (*Uncinula necator*) u količini od 0,1125-0,225 l/ha (1,125-2,25 ml/100m²) preventivno i po pojavi prvih simptoma od faze tri razvijena lista do početka formiranja plodova (13-71 BBCH skala)

Utrošak vode:

Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od 600-1000 l/ha

Preporuke i napomene vezane za primenu

Miklobutanil se ne sme mešati sa preparatima na bazi folpeta, makozeba+metalaksila, i preparatima izrazito bazne reakcije. Maksimalan broj tretiranja četiri puta u zasadima vinove loze i tri puta u zasadima jabuke, u toku godine na istoj površini.

Karenca:

35 dana za jabuku i vinovu lozu

Pakovanje: 1 l, 100 ml

