

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova u usevu suncokreta

Aktivna materija: Diflufenikan 500 g/lit
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja

SHICAN je selektivni herbicid, kontaktne i rezidualne aktivnosti, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova u usevu suncokreta. Prevashodno se apsorbuje izdancima ponika i karakteriše se ograničenom translokacijom.

Primena:

SHICAN se primenjuje u usevu suncokreta u količini 0,25 l/ha (2,5 ml na 100m²) tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva i krova.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Spektar delovanja

Dobro suzbija: štir (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga (*Chenopodium album*), pepeljuga srodisna (*Chenopodium hybridum*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorušica (*Sinapis arvensis*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*).

Zadovoljavajuće suzbija: ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*) i vijušac njivski (*Bylderdikia convolvulus*).

Slabo suzbija: poponac (*Convolvulus arvensis*), palamida (*Cirsium arvense*), tatula (*Datura stramonium*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*) i boca obična (*Xanthium strumarium*)

Preporuke i napomene vezane za primenu

Može biti fitotoksičan u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Kada se primeni prema uputstvu proizvođača, nije fitotoksičan za gajene useve. Međutim, u ekstremnim uslovima (jako povećana vлага) može dovesti do prolazne fitotoksičnosti koja nema uticaja na dalji razvoj i prinos useva.

U slučaju propadanja ili preoravanja useva, na tretiranim parcelama mogu se sejati samo suncokret i pšenica.





U normalnom plodoredu, posle primene diflufenikana nema ograničenja.

Ako u zemljištu posle tretiranja nema dovoljno vlage, delovanje preprata može biti usporeno.

Ukoliko dođe do propadanja useva nakon primene, u jesen, mogu se odmah sejati ozima pšenica i ozimi ječam, a u proleće naredne godine (nakon perioda od 12 nedelja i preoravanja) i ostala strna žita, uljana repica (jara), kukuruz, soja, suncokret, lucerka, mahunarke, krompir, šećerna repa, mrkva, kupusnjače, luk. U normalnom plodoredu posle žetve ozime pšenice i ječma na tretiranim površinama, pri normalnoj obradi zemljišta (oranje na 10-15 cm), mogu se sejati u jesen uljana repica, lisnate kupusnjače, zimski luk, a na proleće svi napred navedeni usevi bez ograničenja.



Agrimatico

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene u suncokretu

Pakovanje: 1 l, 250 ml