

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća

Aktivna materija: Tiofanat metil 700 g/l
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Osobine i način delovanja:

Tiofanat - metil je sistemski fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze β -tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima. Usvaja se preko lista i korena.

Primena:

Kod šljive za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (*Monilinia laxa*) u količini od 0,7 kg/ha

Vreme primene:

Preparat Topsin se primenjuje preventivno. Prvo tretiranje početkom cvetanja i drugo tretiranje u fazi punog cvetanja.

Utrošak vode:

Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od 1000 l/ha.

Tiofanat metil se može koristiti i za druge primene:

- u zasadu breskve za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (*Monilinia laxa*) u količini od 0,7 kg/ha
- u zasadu višnje za suzbijanje sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova (*Monilinia laxa*), tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja
- u zasadu jabuke protiv prouzrokovača skladišnih bolesti poput: *Monilinia sp.*, *Penicillium expansum*, *Colletotrichum gloeosporioides*, *Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*, *Gleosporium fructigenum*, tretiranjem tokom tehnološke zrelosti plodova, najkasnije 15 dana pred berbu a pre ostvarivanja zaraze patogena
- za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (*Didymella applanata*), tretiranjem neposredno posle berbe





- u proizvodnji jagoda koristi se za suzbijanje prouzročivača pegavosti lišća jagode (*Mycosphaerella fragariae*), tretiranjem pre i posle cvetanja i neposredno posle berbe.
- u usevu pšenice za suzbijanje *Septoria spp.*, *Fusarium spp.*, *Alternaria spp.*
- u šećernoj repi se primenjuje za suzbijanje *Cercospora beticola*
- u vinovoj lozi i povrću za suzbijanje prouzročivača sive truleži (*Botrytis cinerea*).
- za suzbijanje prouzročivača zelenog uvenuća (*Verticillium albo-atrum*) zalivanjem, posle rasađivanja.

Tiofanat metil ispoljava sekundarno delovanje na nematode korena.

Mogućnost mešanja:

Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

Karenca: Obezbeđena je vremenom primene.

Pakovanje: 8g, 100g, 1kg



Agrimatco