

*Preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje
bolesti u usevu suncokreta i uljane repice*

Aktivna materija: 125 g/l Azoksistrobin + 125 g/l Difenokonazol
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Osobine i način delovanja

Amistar® Plus sadrži dve aktivne materije (difenokonazol, azoksistrobin) različitog mehanizma delovanja, što je preduslov za izbegavanje ukrštene rezistentnosti. **Difenkonazol** je aktivna materija iz grupe triazola, koja osim preventivnog delovanja na površini biljnih delova, pokazuje i izraženo kurativno delovanje pa može da zaustavi već postojeće zaraze i dalje širenje oboljenja. **Azoksistrobin** je aktivna materija iz grupe strobilurina (QoI) sa vrlo širokim spektrom delovanja. Inhibira ćelijsko disanje (respiraciju), usled čega se zaustavlja kljanje spora, sprečava rast micelije i sporulacija. Osim fungicidnog delovanja, **Amistar® Plus** poseduje biostimulativni efekat koji omogućava biljkama da se lakše adaptiraju na stresne uslove. Pozitivan efekat na produžetak vegetacije pozitivno utiče na povećanje prinosa čak i u odsustvu bolesti!

Primena:

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovaca bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*), crne pegavosti stabljike (*Phoma macdonaldi*) i sivomrke pegavosti (*Phomopsis helianthi*) **u usevu suncokreta**, od izduživanja stabljike do kraja butonizacije; kao i suve truleži (*Phoma lingam*) i bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) **u usevu uljane repice** od faze 4 lista do sredine ili do kraja cvetanja. Preporučena količina primene je 1 l/ha.

U suncokretu se primenjuje dva puta tokom vegetacije, uz razmak od 21 dan, dok se u uljanoj repici jednom primenjuje u jesen i jednom u proleće.





Mogućnost mešanja:

Amistar® Plus se može mešati sa većim brojem drugih fungicida i insekticida, ali prethodno proveriti kompatibilnost. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje.

Karenca:

Suncokret – 60 dana,
Uljana repica – Obezbeđena vremenom primene.



Agrimatco

Pakovanje: 1 l