

# MOXIMATE 725 WP

F U N G I C I D

*Kontaktni i lokalno sitemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem*

**Aktivna materija:** cimoksanil 45 g/kg  
mankozeb 680 g/kg

**Formulacija:** kvašljivi prašak (WP)

## Osobine i način delovanja:

- **Moximate 725WP** je kontaktni i lokalno sitemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem
- Kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja
- Cimoksanil je fungicid preventivnog, kurativnog i anti-sporulacionog delovanja sa brzim prodiranjem u list gde eliminiše patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije preventivnim kontaktnim delovanjem sa produženim efektom

## Primena:

Preparat **Moximate 725WP** koristi se u:

- zasadu **vinove loze** za suzbijanje prouzrokovala **plamenjače** (*Plasmopara viticola*), u količini od **2,5kg/ha** (25 g u 10 l vode).
- usevu **krompira** za suzbijanje prouzrokovala **plamenjače** (*Phytophthora infestans*), u količini od **2,5 kg/ha** (25 g/100 m<sup>2</sup>).

## Količina vode:

200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u vinovoj lozi.

## Preporuke i napomene vezane za primenu:

- **Moximate 725WP** primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
- U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8-10 dana
- U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana treba skratiti.





- **Moximate 725WP** brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku od dva sata nakon primene.
- Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.

#### **Kompatibilnost:**

**Moximate 725WP** se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.

Preparat se na istoj površini može upotrebiti 6–8 puta u toku godine.

#### **Karenca:**

Krompir – 7 dana;  
stone sorte vinove loze – 28 dana;  
vinske sorte vinove loze – 28 dana



**Agrimatco**

**Pakovanje: 1kg; 250g; 25g**