



agrimatco



Katalog • 2026.

Zaštita bilja | Semena ratarskih useva | Veterina | Navodnjavanje i folije
Semena povrtnarskih useva | Mineralna đubriva | Poljoprivredna mehanizacija



agrimatco

worldwide



U službi generacija poljoprivrednika

agrimatco.rs

Od 1936. godine služimo generacijama poljoprivrednika, omogućavajući pristup vrhunskim poljoprivrednim rešenjima i prilagođenim savetima za hiljade proizvođača širom sveta.

Kroz našu razvijenu mrežu globalnih partnera i lokalnih poljoprivrednika, uvodimo najnovije tehnologije i metode u poljoprivredi, gde god poslujemo.

Iz sezone u sezonu, stojimo uz poljoprivrednike dok zajedno grade održivu i uspešnu budućnost.



Zaštita bilja5



Semena ratarskih useva35



Veterina.....47



Navodnjavanje i folije.....57



Semena povrtarskih useva..... 61



Mineralna đubriva73



Poljoprivredna mehanizacija 91

Ovaj katalog je informativnog karaktera. Navedene informacije su date na osnovu postojećih znanja i iskustava u pogledu osobina proizvoda i preporučene primene. Proizvođač zadržava pravo izmena bez najave. Fotografije ambalaže su ilustrativne i mogu se razlikovati od stvarnih po boji i/ili obliku.

Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!





Zaštita bilja



agrimatco

 Herbicidi	6
 Fungicidi	14
 Insekticidi	23
 Okvašivači i đubrivo	31
 Programi zaštite	32



MEZZO 60 WG



Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu

Aktivna materija: 600 g/kg metsulfuron metil

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Primena: U usevu pšenice i ječma od faze tri lista do pojave zastavičara (13-39 BBCH skala), u količini: **10 g/ha** sam preparat Mezzo 60 WG ili sa okvašivačem. Zbog proširenja spektra delovanja može se mešati sa sredstvima na bazi fluroksipira, mekopropa i dikambe.

Karenca: Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 10 g, 100 g



TEMBONE XTRA



Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza

Aktivna materija: tembotrion 44 g/lit + izoksadifen-etil 22 g/l

Formulacija: Uljna disperzija (OD)

Primena: u usevu kukuruza u količini primene od 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m²) u vreme kada su travni korovi u početnim stadijumima porasta (fenofaza nicanja) a širokolisni korovi u fazi od 2 do 6 listova, tretiranjem useva kukuruza u fazi od 2-8 listova. Korovska biljka usvaja preparat najvećim delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna supstanca dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Ne ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama se može sejati kukuruz.

Karenca: OVP

Pakovanje: 1 l



DOLFURON



Selektivni sistemski herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza

Aktivna materija: rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Primena: u usevu kukuruza u količini primene od 40-60 g/ha (0,4-0,6 g na 100 m²) uz dodatak 0,1% okvašivača Inex, za primenu u fazi intenzivnog porasta korova, kada su uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni korovi u fazi od 2-4 lista, tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih od 1-7 listova.

Karenca: kukuruz merkantilni OVP, kukuruz silažni 63 dana

Pakovanje: 50 g



FLUROCAP



Selektivni, translokacioni folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u zasadu jabuke i usevu luka

Aktivna materija: Fluroksipir-meptil 288 g/lit

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena: U zasadu jabuke u količini primene od 1,8-2,5 l/ha (18-25 ml na 100 m²) kad su korovi u fazi intenzivnog porasta tretiranjem do početka cvetanja. U usevu luka u količini primene od 0,8-1,2 l/ha (8-12 ml na 100 m²) kada su korovi u fazi intenzivnog porasta od 2-5 listova, tretiranjem kada je usev u fazi 3-6 listova (13-16 BBCH skale).

Ne koristiti u zasadima jabuke mlađim od 4 godine. Ne ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, ne sejati soju 14 dana nakon primene ovog herbicida.

Flurocap je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na prilepaču, poponac, divlju kupinu, pomoćnicu, tatulu, ambroziju, čičak i abutilon.

Karenca: Jabuka, Luk – OVP

Pakovanje: 1l, 200 ml



KYLEO



Totalni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama

Aktivna materija: 240 g/lit glifosat (IPA so) + 160 g/lit 2,4-D (dimetilamino so)

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Primena: Primenjuje se u voćnjacima starijim od četiri godine, vinogradima, strništima i nepoljoprivrednim površinama. 3–5 l/ha, uz preporuku da se više doze koriste za suzbijanje otpornijih višegodišnjih korovskih vrsta, sa dubokim rizomskim korenovim sistemom, a jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova sa nižom dozom tj. 3 l/ha.

Pakovanje: 1 l



DEVRINOL 45-F



Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u zasadu voća, vinove loze, jagode i povrća (pre rasađivanja)

Aktivna materija: Napropamid 450 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

DEVRINOL 45-F se primenjuje u:

- **zasadu jagode**, u količini 3–6 l/ha (30–60 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u vreme mirovanja vegetacije, a pre kretanja korova, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2–5 cm
- **paprici i paradajzu**, u količini od 2,5–4 l/ha (25–40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2–5 cm (ne primenjuje se kod ranih sorti)
- **kelju, kupusu i karfiolu** u količini: 2–4 l/ha (20–40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2–5 cm
- **duvanu**, 3 l/ha (30 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u lejama za proizvodnju rasada, pre setve, ili, 2,5–4 l/ha (25–40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u polju pre rasađivanja, uz inkorporaciju na 2–5 cm dubine
- **zasadima voća i vinove loze**, 7–10 l/ha (70–100 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u proleće, u zasadima starijim od godinu dana, pre nicanja korova ili posle obrade zemljišta, uz plitku inkorporaciju od 2–5 cm dubine.

Plodored:

- 16 meseci posle primene može se sejati ovas
- 12 meseci posle primene mogu se sejati: pšenica, ječam, raž, kukuruz, sirak, šećerna repa, stočna repa i salata
- Narednog proleća nakon primene mogu se sejati: kupusnjače, paprika, paradajz, duvan, uljana repica, krompir, pasulj, suncokret

Karenca: 70 dana za kelj, kupus, karfiol; OVP za vinovu lozu, voće, jagodu, duvan, papriku, paradajz

NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (laka i peskovita zemljišta sa < 1% humusa), na tresetnim i polutresetnim zemljištima (> 10 % humusa), na izrazito suvim i izrazito vlažnim zemljištima.

Maksimalan broj tretiranja: Jednom na istoj parceli, tokom vegetacije

Pakovanje: 1 l , 100 ml



BASICO 480 SL



Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Aktivna materija: Dikamba 480 g/lit

Formulacija: Koncentrovani rastvor SL

Primena:

Posle klijanja i nicanja korova kada se nalaze u mlađem razvojnem stadijumu (2-6 listova), odnosno kada je kukuruz u fazi do 5 listova, u količini od 0,5 – 0,7 l/ha (5 – 7 ml na 100 m²).

Spektar delovanja: štir, ambrozija, pepeljuga, lubeničarka, dvornik veliki, pomoćnica, čičak, abutilon, tatula, dvornik ptičji, njivska palamida, poponac.

Karenca: obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 1 lit.



ASTRAL 40 OD



Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: Uljna disperzija (OD)

Jednokratna primena

- 1,0-1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100m²), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, tretiranjem kada kukuruz ima 2-6 razvijenih listova, kada su širokolisni korovi u fazi 2-6 lista, a divlji sirak 15-20 cm.

Dvokratna primena

- Prvi tretman 0,5 l/ha (5 ml na 100m²) kada su korovi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao;
- Drugi tretman 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m²), nakon nicanja novih korova

Karenca: OVP – kukuruz

Pakovanje: 1l



VIKING



Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe

Aktivna materija: metamitron 700 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

- jednokratno u količini 3 i 4 l/ha kada su korovi u fazi kotiledona do razvijenih 6 listova, a šećerna repa u fazi 2-6 listova
- dvokratno u količini 1,5 + 1,5 l/ha i 2 + 2 l/ha

Prvo tretiranje kada su korovi u fazi kotiledona do razvijena 4 lista, a šećerna repa u fazi 2 lista, i drugo tretiranje kada su korovi ponovo nikli pa do razvijena 4 lista.

Dobro suzbija sledeće korove: štir obični (*Amaranthus retroflexus*), ambroziju (*Ambrosia artemisiifolia*), vijušac njivski (*Bilderdia convolvulus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolika (*Chenopodium hybridum*), tatula obična (*Datura stramonium*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), dvornik obični (*Polygonum persicaria*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*), obična pomoćnica (*Solanum nigrum*) i boca obična (*Xanthium strumarium*)

Karenca: obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 5 l



ESMERO



Selektivni sistemski herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

Aktivna materija: mezotrion 480 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Primena: Esmero je veoma selektivan u odnosu na usev kukuruza tako da se može primeniti posle setve a pre nicanja, i u toku vegetacije sve do 8. lista kukuruza. Korovi treba da su u optimalnoj fazi za suzbijanje, a to je od 2 – 6 pravog lista.

Količina primene: 0,15 – 0,25 lit/ha + okvašivač Inex (100 ml/100 l vode)

Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Pakovanje: 1 l, 250 ml



DICOPUR TOP 464 SL



Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza

Aktivna materija: dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Količina primene: 0,8 – 1 l/ha.

U pšenici i ječmu se koristi od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca, a u usevu kukuruza od 2-5 lista kukuruza.

Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz i pšenicu

Pakovanje: 1 l



KERB FLO



Selektivni herbicid za suzbijanje travnih i osetljivih širokolisnih korova u usevima šećerne repe, salate, endivije, cikorije, zasadima jabuke i kruške

Aktivna materija: Propizamid (400 g/lit)

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Šećerna repa: u dozi od 0,7-1 l/ha, posle koje sledi doza od 1-1,5 l/ha nakon 7-10 dana protiv viline kosice (*Cuscuta sp.*) u ranim stadijumima razvoja. Ukoliko se vilina kosica već ukorenila, tretirati dozom od 4-5 l/ha; ne tretirati sve dok manje razvijene stabljike repe ne dostignu stadijum od 5-6 pravih listova. Najviša doza se upotrebljava kada je vilina kosica već parazitski zaposela šećernu repu.

Salate, endivija, cikorija: U dozi od 3,5-4,5 l/ha u periodu: posle setve ili presađivanja a pre pojave korova (tretman se vrši 15 – 20 dana nakon setve ili rasađivanja), ili posle pojave korova (samo u jesen i zimu na vlažnom zemljištu). tretman se vrši u narednih 15-20 dana od setve ili od presađivanja); b) posle izbivanja korova, samo u jesen-zimu na vlažnom zemljištu.

Jabuka i Kruška: u dozi od 3,5 l/ha, za kontrolu ljulja (*Lolium spp.*), tretman treba sprovesti od novembra do januara-početka februara nakon izbivanja korova.

Količina vode: 600 – 800 l/ha, odnosno 6 – 8 l na 100 m².

Karenca: Salate, endivija, cikorija: 40 – 60 dana; Šećerna repa: više od 50 dana; Jabuka i kruška: /

Pakovanje: 50 ml, 1 lit, 20 lit



ALADIN



Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i kukuruza

Aktivna materija: Bentazon 480 g/lit

Formulacija: Koncentrovani rastvor SL

Primena:

- **Kukuruz:** 3- 4 l/ha kada je kukuruz u fazi 1 do 5 listova, a korovi 2 do 6 listova
- **Soja:** 3- 4 l/ha kada je soja u fazi prve do treće troliske, a korovi 2 do 6 listova

Plodored: Nema ograničenja u plodoredu

Karenca: Soja, Kukuruz – 63 dana

Pakovanje: 1 l, 10 l



BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360

Barclay

*Neselektivni (totalni) herbicid za suzbijanje
jednogodišnjih i višegodišnjih korova*

Aktivna materija: Glifosat 480 g/l u obliku izopropilamino soli

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Primena:

1. U zasadima jabučastog i koštičavog voća i vinove loze (min, 3 godine starosti), u količini: 2 – 3 l/ha (20–30 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova iz semena; 4 – 6 l/ha (40–60 ml na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih korova; Primenjuje se sa zemlje uz utrošak vode 150–200 l/ha (1,5–2 l na 100 m²).
2. Na površinama za pošumljavanje: u količini 3–5 l/ha (30–50 ml na 100 m²), tretiranjem pre setve ili posle setve a pre nicanje rasada, primenom sa zemlje i uz utrošak vode 250–300 l/ha (2,5–3 l na 100 m²);
3. Za suzbijanje izbojaka i izdanaka iz panjeva: tretiranjem panjeva odmah posle seče stabala, sa rastvorom koncentracije 3,5%.
4. Za tretiranje strništa, u količini 2–6 l/ha (20–60 ml na 100 m²), primenom sa zemlje i uz utrošak vode 150–300 l/ha (1,5–3 l na 100 m²);
5. Na livadama i pašnjacima, 4–6 l/ha (40–60 ml na 100 m²), za totalno suzbijanje korova, pre zaoravanja; Primenom sa zemlje i uz utrošak vode 250–300 l/ha (2,5–3 l na 100 m²);
6. Na nepoljoprivrednim površinama (suvi kanali, jendeci, železničke pruge): u količini 5–7 l/ha (50–70 ml na 100 m²), tretiranjem sa zemlje uz utrošak vode 250–300 l/ha (2,5–3 l na 100 m²).

Pakovanje: 20 l



HILUX



Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron metil)

Aktivna materija: Tribenuron metil 750 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Primena:

U usevu **pšenice** se primenjuje folijarno kada je pšenica u fenofazi od tri lista do pojave 2 kolenca (BBCH 13–32), a korovi od kotiledona do 6 listova u količini primene 15–25 g/ha + 0,1% okvašivača Inex.

U usevu **suncokreta** (tolerantnog na tribenuron metil) se primenjuje folijarno kada je suncokret u fazi od 2–8 listova (BBCH 12–18) a korovi u fazi 2–4 lista, u količini primene 30 g/ha + 0,1% okvašivača Inex.

Plodored: U normalnom plodoredu nema ograničenja

Karenca: Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 30 g



MOXBET



Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, i nekih uskolisnih korova u usevu soje i suncokreta (samo hibridi tolerantni na imidazolinone)

Aktivna materija: Imazamox 40 g/lit

Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje: 1l

Primena: Suncokret (samo hibridi tolerantni na imidazolinone) : 1–1,2 l/ha kada suncokret razvije drugi par listova. Soja: 1–1,2 l/ha kada je soja u fazi od druge do treće troliske, a korovi 2 do 6 listova

Plodored: Nakon primene preparata mogu se gajiti: posle 4 meseca: pšenica, ječam, raž, suncokret i duvan; posle 9 meseci: kukuruz i krompir; posle 12 meseci: uljana repica i šećerna repa.

Karenca: Soja – 35 dana; Suncokret – obezbeđena vremenom primene



TONAL

Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, i nekih uskolisnih korova u usevu soje

Aktivna materija: bentazon 480 g/l + imazamoks 22,4 g/l

Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

Primena: *Soja:* Primjenjuje se dvokratno u količini 0,9 + 0,9 l/ha (uz dodatak okvašivača Inex), kada je usev u fazi

1 - 3 trolista. Prvo tretiranje se obavlja kada je većina korova od kotiledona do 4 lista; drugo tretiranje posle 7-14 dana.

Plodored: Nakon primene preparata mogu se gajiti: posle 4 meseca: pšenica, ječam, raž, suncokret i duvan; posle 9 meseci: kukuruz i krompir; posle 12 meseci: uljana repica i šećerna repa

Karenca: Soja – obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 1l



SHARPEN



Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta i crnog luka iz arpadžika

Aktivna materija: pendimetalin 330 g/lit

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Primena: *Suncokret:* 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m²) posle setve, a pre nicanja useva i korova

Luk iz arpadžika: 5 l/ha (50 ml na 100 m²) posle sadnje, a pre nicanja useva i korova

Plodored: U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati samo kukuruz, a nakon tri meseca i drugi usevi u kojim se primenjuje.

Karenca: Luk – 63 dana; Suncokret – obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 1lit



CHROME SINON



Selektivni, sistemski herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje

Aktivna materija: Klomazon 500 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:

- U usevu **soje**, kada je usev u fazi od 1 - 3 troliske, u količini od 0,5 l/ha

Plodored:

Posle primene u usevu soje može se sejati:

- u proleće naredne godine: kukuruz, krompir, šećerna repa, soja i pasulj
- u jesen naredne godine: ozima žita, lucerka i detelina
- u drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu.

Karenca: Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 1l



FARGO EXTRA

Rainbow
all about growing

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova

Aktivna materija: kletodim 240 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:

Preparat FARGO EXTRA koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih korova):

- u usevu **soje**, tretiranjem posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 2-5 listova, u količini 0,4-1 l/ha.

Dobro suzbija: divlji sirak iz semena i rizoma, divlji ovas, zubača obična, muhar sivi, muhar zeleni, obična svračica, proso korovsko

Karenca: Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 1 l



VALESURE

Rainbow
all about growing

Neselektivni sistemski herbicid sa rezidualnom aktivnošću, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korovskih vrsta u zasadu jabuke i na nepoljoprivrednim površinama

Aktivna materija: Flazasulfuron 250 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Primena: u zasadu jabuke i na nepoljoprivrednim površinama u količini primene od 0,15-0,2 kg/ha (1,5-2 g na 100 m²) ha uz dodatak 0,1% okvašivača Inex tretiranjem u toku vegetacije u ranoj fazi razvoja korova kada su korovi visine 10 - 20 cm. U zasadu jabuke kod tretiranja u trake primeniti u količini primene 50-60 g/ha.

Flazasulfuron pripada grupi sulfonilurea. Usvaja se lisnom masom.

U retkim slučajevima može da dovede do pojave hlorotičnih traka na listovima. Međutim, simptomi su prolaznog karaktera i ne utiču na prinos. S obzirom da ispoljava rezidualno delovanje preko zemljišta nakon višegodišnje primene herbicida u slučaju smanjenja zakorovljenosti smanjiti dozu primene.

Karenca: jabuka 60 dana

Pakovanje: 20 g , 200 g



KADETT

SC
Sharda Cropchem

Neselektivni sistemski herbicid za suzbijanje drvenastih i zeljastih korova na nepoljoprivrednim površinama

Aktivna materija: Triklopir 480 g/lit

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:

- suzbijanje drvenastih i zeljastih korova **na nepoljoprivrednim površinama** u količini 1 l/ha (10 ml na 100 m²)
- Preporuka za primenu: kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta, a drvenasti u fazi razvoja novog lišća.
- Maksimalan broj tretiranja: Jednom, u toku vegetacione sezone
- Na tretiranim površinama sadnja se može obaviti 6 meseci nakon primene sredstva.

Radna karenca: 48 časova

Pakovanje: 1l, 100 ml



RIDOWN

Rainbow
all about growing

Neselektivni sistemski herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta

Aktivna materija: glifosat IPA so 480 g/lit

Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

Primena:

na nepoljoprivrednim površinama u količini primene od 3 – 6 l/ha i 12 l/ha (30 – 60ml i 120 ml na 100 m²) u toku vegetacije tretiranjem korova kada su u fazi intenzivnog porasta a najkasnije do faze punog cvetanja korova

Manje doze sredstva koristiti pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, u ranijim fazama rasta korova (10-15 cm) i u povoljnijim vremenskim uslovima sa manjim količinama padavina.

Veće doze sredstva koristiti pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, u kasnijim fazama rasta korova (20-40 cm) i u nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama padavina.

Maksimalne doze sredstva koristiti za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova.

Karenca: za nepoljoprivredne površine nije potrebna.

Pakovanje: 1l, 5l, 20l



RINCOR

S C
Sharda Cropchem

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Jednokratna primena:

- 1-1,25 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, tretiranjem kada kukuruz ima 2-6 razvijenih listova, kada su širokolisni korovi u fazi 1-3 lista, a divlji sirak 15-20 cm.

Dvokratna primena

- Prvi tretman 0,5 l/ha kada su korovi u fazi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao
- Drugi tretman 0,75 l/ha, 8-10 dana nakon prvog tretiranja, kad je divlji sirak visine 15-20 cm

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Pakovanje: 300 ml, 1 l



SUNWARD

Rainbow
all about growing

Selektivni sistemski herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija: Isoxaflutole 240g/L + Cyprosulfamide 240g/L

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

Sunward se koristi u usevu kukuruza u količini primene 0,4 l/ha i utrošak vode 200-400 l/ha, tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova ili tretiranjem posle nicanja useva i korova, a najkasnije do razvoja trećeg lista kukuruza (do faze 13 BBCH skale), a kada korovi nisu još iznikli ili su u fazi nicanja.

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Pakovanje: 500 ml, 1 l



SHUB 80 WG



Kontaktни fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje bolesti u voćarstvu

Aktivna materija: Kaptan 800 g/kg

Formulacija: vodorastvorljive granule (WG)

Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid, pošto ima delovanje na više različitih mesta u ćeliji gljive

Primena:

- **Jabuka** – za suzbijanje čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (*Venturia inaequalis*); 1,5 – 1,8 kg/ha preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu, počev od faze mišje uši.

Napomena: SHUB 80 WG se ne meša sa bordovskom i sumporno krečnom čorbom, EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

Karenca: Jabuka 21 dan

Pakovanje: 1kg



FIGHTER



Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu

Aktivna materija: 800 g/kg Folpet

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Primena:

- u zasadu **vinove loze** za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Plasmopara viticola*) u količini od 1,25-2,4 kg/ha, primena protiv sekundarnih zaraza, tokom intenzivnog porasta, a najkasnije po ostvarivanju uslova za infekciju
- u zasadu **jabuke** za suzbijanje prouzrokovaca čađave pegavost lista i krastavosti ploda (*Venturia inaequalis*), u količini od 1,25 kg/ha, preventivno, tokom perioda primarnih zaraza, ili prema preporuci prognozo-izveštajne službe.

Karenca: 21 dan za jabuku, 35 dana za vinovu lozu

Pakovanje: 250g, 1kg



SHANON



Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca bolesti u zasadu jabuke

Aktivna materija: 700 g/kg Ditanon

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Primena:

- U zasadu **jabuke** za suzbijanje prouzrokovaca čađave pegavost lista i krastavosti ploda (*Venturia inaequalis*), u količini od 0,07% (7 g na 10 lit vode), preventivno, pre sticanja uslova za primarno zaražavanje, kao i tokom perioda sekundarnih infekcija.

Karenca: 35 dana za jabuku

Pakovanje: 1kg



ELATUS ERA

syngenta

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, za suzbijanje najvažnijih prouzrokovaca bolesti lista, stabla i klasa u usevima pšenice i ječma

Aktivna materija: 75 g/l Benzovindiflupir (SOLATENOL™) +150 g/l Protiokonazol
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena: *Pšenica:* u fazi lista zastavičara ili na početku cvetanja za zaštitu klasa, u količini primene 0,8 l/ha za suzbijanje bolesti - Lisna rđa (*Puccinia recondita*), žuta rđa (*Puccinia striiformis*), siva pegavost lista (*Septoria tritici*), siva pegavost lista i klasa (*Septoria nodorum*), trulež klasa (*Fusarium spp.*)

Ječam: za prvi tretman protiv mrežaste pegavosti, rde i pepelnice ili u fazi lista zastavičara za suzbijanje ramularijske i mrežaste pegavosti ječma u količini primene 0,8 l/ha (Rđa (*Puccinia hordei*), mrežasta pegavost lista (*Pyrenophora teres*), sočivasta pegavost (*Rhynchosporium secalis*), ramularijska pegavost (*Ramularia collo-cygni*)).

ELATUS® ERA je kombinacija dve aktivne materije: nove, inovativne aktivne materije SOLATENOL® i provenog protiokonazola. SOLATENOL® pripada hemijskoj grupi pirazol-karboksamida (SDHI) i deluje kao inhibitor enzima sukcinat-dehidrogenaze ometajući normalan transport elektrona u mitohondrijama u procesu disanja. Osim toga, negativno utiče na porast micelije i na klijanje spora, sprečavajući na taj način dalje širenje patogena.

Protiokonazol, aktivna materija iz grupe triazola, odlikuje se produženim preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, i u kombinaciji sa SOLATENOL®-om omogućava efikasno i dugotrajno suzbijanje širokog spektra bolesti pšenice i ječma, a istovremeno sprečava i pojavu rezistentnosti.

Snaga fungicida ELATUS® ERA ne odražava se samo u snažnom suzbijanju bolesti, nego i u fiziološkom efektu, bojem iskorišćavanju azota i vode i produženju vegetacije što dokazano utiče na povećanje prinosa.

Karenca: Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 1l



PERGADO™ F

syngenta

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače vinove loze

Aktivna materija: mandipropamid 50 g/kg; folpet 400 g/kg
Formulacija: vodotopive granule (WG)

Primena: Pergado™ F se primenjuje preventivno za suzbijanje plamenjače vinove loze u količini 2,5 kg/ha i uz maksimalan broj od 4 tretmana u razmacima 8-14 dana (zavisno od jačine napada, brzine porasta biljke i vremenskih uslova). Tretiranje se obavlja preventivno, po nastanku povoljnih uslova za pojavu bolesti (desetak litara kiše tokom 2-3 dana pri umerenim temperaturama vazduha) ili prema preporuci prognozo-izveštajne službe.

Karenca: 35 dana za vinovu lozu

Pakovanje: 5 kg



AMISTAR PLUS

syngenta

Preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u usevu suncokreta i uljane repice

Aktivna materija: Azoksistrobin 125g/l + Difenokonazol 125g/l
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena: *Suncokret:* za suzbijanje prouzrokovaca bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*), crne pegavosti stabljike (*Phoma macdonaldi*) i sivomrke pegavosti (*Phomopsis helianthi*) u količini primene 1 l/ha, od izduživanja stabljike do kraja butonizacije.

Uljana repica: za suzbijanje suve truleži (*Phoma lingam*) i bele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) u usevu uljane repice u količini primene 1 l/ha, od faze 4 lista do sredine ili do kraja cvetanja.

Osim fungicidnog delovanja, AMISTAR® PLUS poseduje biostimulativni efekat koji omogućava biljkama da se lakše adaptiraju na stresne uslove. Pozitivan efekat na produžetak vegetacije pozitivno utiče na povećanje prinosa čak i u odsustvu bolesti.

U suncokretu se primenjuje dva puta tokom vegetacije, uz razmak od 21 dan, dok se u uljanoj repici jednom primenjuje u jesen i jednom u proleće.

Karenca: 60 dana za suncokret a obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu.

Pakovanje: 1l



CYFLAMID

Nisso

Preventivni i kurativni fungicid, za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice u zasadu jabuke i vinove loze

Aktivna materija: Ciflufenamid 50 g/l

Formulacija: Emulzija ulja u vodi (EW)

Primena:

Jabuka: Tokom vegetacije, (BBCH 11-73), kada su prvi listovi otvoreni do drugog opadanja plodova, u količini primene 0,5 l/ha, za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice jabuke (*Podosphaera leucotricha*)

Vinova loza: Tokom vegetacije, (BBCH 11-75), kada je prvi list razvijen i pojavljuje se iz začetka lastara, do faze kada su bobice veličine graška, a grozdovi obešeni, u količini primene 0,5 l/ha, za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice vinove loze (*Uncinula necator*)

Ciflufenamid je sistemski fungicid iz grupe fenilacetamida, svoje dejstvo na površini biljnih organa ispoljava preventivno ali i kurativno, delujući spolja i unutar gajene biljke. U biljci se širi translaminarno, a uz postojeću gasovitu komponentu dodatno i isparavanjem. Jedinstveni način delovanja zasnovan je na zaustavljanju rasta i razvoja gljiva na više mesta u razvojnem ciklusu. Fungicid primenjen preventivno sprečava formiranje haustorija i razvoj micelije, a u kasnijoj fazi utiče na zaustavljanje sporulacije gljive. Ciflufenamid posjeduje odlične preventivne i kurativne osobine te se karakteriše delovanjem gasovitom fazom što mu daje dodatnu prednost u odnosu na standardne fungicide. Svojim delovanjem sprečava razvoj i sposobnost širenja patogena na zdrave biljke.

Karenca: Vinova loza 21 dan, jabuka: 14 dana.

Pakovanje: 1lit, 50 ml



AMBASADOR

Sharda Cropchem

Sistemski fungicid za suzbijanje prouzrokovaca čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju - EC

Primena: Preparat AMBASADOR primenjuje se u zasadima jabuke i kruške sa produženom preventivnom i kurativnom zaštitom biljaka za suzbijanje prouzrokovaca čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova (*Venturia inaequalis*).

Količina primene: U količini primene od 0,15 l/ha (1.5 ml na 100 m²) u toku primarnih zaraza počev od faze otvaranja prvih lisnih pupoljaka pa dok plodovi ne dostignu veličinu 2-3 cm. U zavisnosti od postojanja uslova za ostvarivanje i širenje zaraze, obično su potrebna četiri tretiranja u intervalima od 10 dana, uz utrošak vode od 1000-1500 l/ha.

Karenca: 21 dan za jabuku i krušku

Pakovanje: 50ml ; 200ml ; 1 lit



CHAMP DP

Nufarm

Kontaktni fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovaca bolesti tipa plamenjača i pegavosti u usevima paradajza, paprike, krompira i zasadu vinove loze

Aktivna materija: bakar hidroksid 655 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Primena:

- u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*) u količini od 2 kg/ha
- u usevu krompira za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače krompira (*Phytophthora infestans*) u količini od 2 kg/ha
- u usevu paradajza za suzbijanje plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini od 2 kg/ha
- u usevu paprike za suzbijanje bakterioze (*Xanthomonas euvesicatoria*) u količini od 2 kg/ha
- u usevu šećerne repe za suzbijanje *Cercospora Beticola* u količini od 2 kg/ha

Karenca: 7 dana za krompir, paradajz i papriku; 28 dana za vinovu lozu

Pakovanje: 1 kg ; 200 g



AZBANY 250 SC



Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu

Aktivna materija: azoksistrobin 250 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

- U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovaca **sive pegavosti** lista šećerne repe (*Cercospora beticola*). Primenuje se po pojavi prvih simptoma pegavosti u količini od 0,8 lit/ha.
- U zasadu maline za suzbijanje prouzrokovaca **sušenja lastara** (*Didymella applanata*) u koncentraciji **0,075%** (7,5 ml u 10 l vode na 100 m²), preventivno tokom intenzivnog porasta izbojaka i neposredno posle berbe maline, odnosno tokom vegetacije do pred berbu poštujući propisanu karenca.

Zbog svoje široke efikasnosti i kratke karence, u drugim zemljama azoksistrobin se koristi protiv velikog broja patogena (plamenjače, crne pegavosti, pepelnice) u velikom broju povrtarskih kultura, u jagodastom voću, usevu žitarica i zasadu vinove loze.

Karenca: 3 dana za paradajz; 4 dana za krastavac; 10 dana za malinu; 14 dana za krompir; 21 dan za vinovu lozu; 21 dan za šećernu repu

Pakovanje: 100 ml, 250 ml, 1 l



CIMORAM



Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače i bakterioza

Aktivna materija: Cimoksanil 40 g/kg + Bakar iz Bordovske čorbe 200 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Primena:

Preparat CIMORAM koristi se za suzbijanje bolesti u:

- **Vinova loza** plamenjača (*Plasmopara viticola*), antraknoza (*Elisnoe ampelina*, *Colletotrichum spp.*) 2,8–3 kg/ha. Primena tokom formiranja prvih pupoljaka do promene boje ploda, maksimalno 4 puta tokom vegetacije u intervalu od 7 dana
- **Krompir** plamenjača (*Phytophthora infestans*), 2,8–3 kg/ha. Primena tokom pojave prvih izdanaka do pred fazu kada je 50% listova braonkaste boje, maksimalno 5 puta tokom vegetacije u intervalu od 7 dana
- **Paradajz** plamenjača (*Phytophthora infestans*), bakterioze (*Pseudomonas spp.*, *Xanthomonas spp.*) 2,8–3 kg/ha. Primena od pojave 3–4 lista do 50 % zrelosti plodova, maksimalno 6 puta tokom vegetacije u intervalu od 7 dana

- **Tikvice** plamenjača (*Pseudoperonospora cubensis*), bakterioza (*Pseudomonas spp.*, *Xanthomonas spp.*) 2,8–3 kg/ha. Primena od pojave 3–4 lista do faze kada je 10% plodova obojeno tipičnom bojom, maksimalno 4 puta tokom vegetacije u intervalu od 7 dana
- **Crni i beli luk** plamenjača (*Peronospora destructor*), bakterioze (*Pseudomonas spp.*, *Xanthomonas spp.*) 2,8–3 kg/ha, primena od pojave 3–4 lista do početka pojave lukovice, maksimalno 4 puta tokom vegetacije u intervalu od 7 dana
- **Ruže** plamenjače (*Peronospora sp.*) 2,8–3 kg/ha. Primena od pojave 3–4 lista do početka cvetanja, maksimalno 3 puta tokom vegetacije u intervalu od 7 dana

Karenca: vinova loza – 28 dana, krompir – 14 dana, paradajz – 3 dana, tikvica, crni luk, beli luk – 7 dana

Pakovanje: 30 g, 1 kg



SHARTEB



Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice vinove loze i pšenice, krastavosti plodova u zasadu jabuke, i mrke truleži plodova u zasadu višnje

Aktivna materija: tebukonazol 250 g/l
Formulacija: Emulzija ulje u vodi (EW)

Primena:

- u zasadu **vinove loze** za suzbijanje prouzrokovala pepelnice (*Uncinula necator*) u dozi od 0,4 l/ha (4 ml na 100 m²), preventivno ili neposredno po pojavi prvih simptoma bolesti,
- u zasadu **jabuke** za suzbijanje prouzrokovala čadave pegavost lista i krastavosti ploda (*Venturia inaequalis*), u dozi od 0,7 l/ha (7 ml na 100 m²), preventivno, tokom perioda primarnih zaraza
- u zasadu **višnje**, za suzbijanje prouzrokovala sušenja cvetova i rodni grančica i mrke truleži plodova (*Monilinia laxa*) u dozi od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), preventivno, tokom cvetanja
- u usevu **pšenice** za suzbijanje prouzrokovala pepelnice (*Erysiphe graminis*) u dozi od 1 l/ha (10 ml na 100 m²), preventivno, tokom perioda primarnih zaraza

Karenca: 21 dan za jabuku, višnju, vinovu lozu i pšenicu
Pakovanje: 100ml ; 1 lit



NEORAM

Gowan®

Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje plamenjače vinove loze

Aktivna materija: bakar (Cu) iz bakar-oksihlorida 375 g/kg
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Primena:

U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovala plamenjače (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji 0,3% (30 g u 10 l vode) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100 m²) preventivnim tretiranjem od početka cvetanja (od faze 53 BBCH skale), a pre ostvarenja uslova za zaraze.

Karenca: 28 dana za vinovu lozu

Pakovanje: 1 kg; 10 kg



AZTROSTAR

Rainbow
all about growing

Sistemičnim fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u krompiru i malini

Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/lit
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

U usevu **krompira** za suzbijanje prouzrokovala plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini primene od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²) preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja, tretiranjem u toku vegetacije

U zasadu **maline** za suzbijanje prouzrokovala sušenja lastara (*Didymella applanata*) u količini primene od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²) preventivno, kada se očekuju povoljni uslovi za zaražavanje i širenje oboljenja (od kraja maja), tretiranjem od faze kada su prvi lastari dužine oko 60 cm.

Karenca: krompir 14 dana, malina 10 dana.

Pakovanje: 1l



KINGKONG XTRA

Rainbow
all about growing

Sistemični translaminarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za primenu u zasadima jabuke i višnje

Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Primena:

U zasadima jabuke za suzbijanje prouzrokovaca čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (*Venturia inaequalis*) u koncentraciji primene od 0,02-0,03 % (2-3 g u 10 l vode) preventivno tokom perioda primarnih zaraza tretiranjem od početka vegetacije, fenofaza "mišijih ušiju", do fenofaze formiranja plodova veličine 10-20 mm.

U zasadima višnje za suzbijanje prouzrokovaca sušenja cvetova i rodni grančica (*Monilinia laxa*) u količini primene od 0,2 kg/ha (2 g na 100 m²) preventivno pre ostvarivanja uslova za zarazu tretiranjem od fenofaze početka cvetanja do precvetanja.

Ciprodinil spada u hemijsku grupu anilinopirimidina, inhibitori sinteze metionina. Ne primenjivati više od dva tretiranja u toku jedne vegetacione sezone. Sistemični fungicid, ispoljava aktivnost nakon usvajanja u biljna tkiva. Aktivna supstanca se usvaja, a zatim prenosi u oba smera.

Karenca: višnja 14 dana, jabuka 28 dana.

Pakovanje: 200g



PREGUARD

Rainbow
all about growing

Fungicid sa protektivnim i rezidualnim delovanjem namenjen za primenu u zasadima jabuke i krompira

Aktivna materija: Fluazinam 500 g/lit

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

U zasadima jabuke za suzbijanje prouzrokovaca čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (*Venturia inaequalis*) u količini primene od 0,6 - 1 l/ha (6 - 10 ml u 10 L vode) preventivno pre ostvarivanja uslova za primarno zaražavanje tokom vegetacije tretiranjem od početka cvetanja do faze kada plodovi dostignu 70 % veličine

U usevu krompira za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini primene od 0,3 - 0,4 l/ha (3 - 4 ml na 100 m²), preventivno tokom vegetacije tretiranjem po pojavi uslova za ostvarivanje infekcije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja.

Maksimalan broj tretiranja: tri puta, na istoj površini u toku godine. Interval između dva tretiranja: 7-14 dana.

Fluazinam spada u hemijsku grupu toludini. Mehanizam delovanja: prekidaju oksidativnu fosforilaciju. Postoji nizak rizik u pogledu razvoja rezistentnosti. Suzbija fitopatogene gljive na više načina: inhibira ćelijsko disanje odnosno inhibira klijanje spora, rast i sporulaciju gljive. Ovakav "multi site" način delovanja smanjuje mogućnost od nastanka rezistentnosti.

Napomena za primenu: u zasadima jabuke sredstvo je najbolje primeniti preventivno, po pravilu pre kiše (ostvarivanja zaraze) kada su temperature iznad 10 °C ili prema preporukama prognoznog izveštajne službe. Kod semenskog krompira se preporučuje kasnija primena zbog efekata na sporulaciju patogena, odnosno za sprečavanje zaražavanja krtola.

Karenca: krompir 7 dana, jabuka 28 dana.

Pakovanje: 1l, 200 ml



RIVAL



*Sistemični fungicid sa preventivnim delovanjem
za suzbijanje bolesti u povrtarstvu*

Aktivna materija: propamokarb-hidrohlorid 722 g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Primena:

U usevima paprike i paradajza, za suzbijanje prouzrokovaca poleganja rasada (*Phytium spp.*) u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 l vode), tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva, ili neposredno nakon nicanja. Način primene: zalivanjem uz utrošak 10 l pripremljenog rastvora na 1 m².

U lukovičastom cveću u cilju sprečavanja poleganja rasada (*Phytium spp.*), u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 l vode), neposredno posle sadnje lukovica. Način primene: zalivanjem uz utrošak 10 l pripremljenog rastvora na 1 m².

U usevu krastavca salata i kornišona, za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u koncentraciji od 0,2 % (20 ml u 10 l vode), tretiranjem po pojavi prvih simptoma kod salata, ili od faze prvih pravih listova kod kornišona. Način primene: 200-400 lit/ha finim prskanjem ili orošavanjem, ili 0,5 l/po kućici zalivanja.

Karenca: 14 dana za krastavac i paradajz, 35 za papriku

Pakovanje: 1l, 100 ml



RIVAL DUO



*Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem
za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače krompira*

Aktivna materija: propamokarb-hidrohlorid 400 g/l + cimoksanil 50 g/lit
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

U usevu krompira za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini 2,5 L/ha.

Primenjuje se preventivno pre pojave infekcije, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma, kad je jevidljiv prvi izdanak u osnovi (< 5 cm) do faze kada 50% listova poprimi mrku boju (BBCH 20-95).

Utrošak vode: 200-500 L/ha.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: četiri puta sa intervalom od 7-10 dana između tretiranja.

Karenca: krompir 14 dana

Pakovanje: 1l, 250 ml



ADICONSTAR



*Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim
delovanjem za suzbijanje bolesti u usevu šećerne repe i pšenice*

Aktivna materija: Azoksistrobin 200 g/lit + Difenokonazol 125 g/lit
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovaca pegavosti lista šećerne repe (*Cercospora beticola*) u količini primene od 1 l/ha (10 ml na 100 m²) preventivno ili po pojavi prvih simptoma oboljenja tretiranjem tokom vegetacije od faze početka razvoja rozete (listovi prekrivaju 10 % površine, BBCH 31) do zatvaranja redova (49 BBCH skale).

Azoksistrobin spada u hemijsku grupu strobilurini. Deluje na respiratorni sistem patogena ometajući normalan proces transporta elektrona u kompleksu 3 (na Qo mestu). Difenokonazol pripada hemijskoj grupi triazola, fungicidi inhibitori sinteze sterola.

Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u šećernoj repi računajući i primenu drugih fungicida iz grupe strobilurina, sa intervalom od 14 - 21 dana.

Karenca: šećerna repa 35 dana.

Pakovanje: 1l



COPROTEC

Rainbow
all about growing

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u usevu pšenice

Aktivna materija: Protiokonazol 125 g/lit + Tebukonazol 125 g/lit
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:

U usevu pšenice za suzbijanje prouzrokovala pepelnice (*Blumeria graminis*), sive pegavosti lista (*Septoria spp*), rđe (*Puccinia spp*) i paleži klasa (*Fusarium spp*) u količini 0,75-1,0 l/ha (7,5-10 ml na 100 m²) preventivnim tretiranjem ili po pojavi prvih simptoma bolesti u uslovima povoljnim za nastanak infekcije od početka vlatanja pa do početka cvetanja.

Protiokonazol i tebukonazol pripadaju hemijskoj grupi triazola.

Maksimalan broj tretiranja: dva puta, na istoj površini u toku godine

Karenca: pšenica 42 dana.

Pakovanje: 1l



KARBICURE



Višenamenski kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, dozvoljen za primenu u organskoj proizvodnji

Aktivna materija: Kalijum bikarbonat 850 g/kg
Formulacija: Vodorastvorljivo prašivo (SP)

Primena:

- *vinova loza* za suzbijanje pepelnice (*Uncinula necator*) i sive truleži (*Botrytis cinerea*) u količini 5 kg/ha
- *jagoda* na otvorenom, u zaštićenom (plastični tuneli) i zatvorenom prostoru za suzbijanje pepelnice (*Podosphaera aphanis*) u količini 3 kg/ha
- *ribizla* na otvorenom i u zaštićenom prostoru (plastični tuneli) za suzbijanje pepelnice (*Sphaerotheca mors-uvae*) u količini 5 kg/ha
- *paradajz*, paprika, patlidžan u zaštićenom (plastični tuneli) i zatvorenom prostoru za suzbijanje pepelnice (*Leveillula taurica*) u količini 3 kg/ha
- *jabuka* za suzbijanje krastavosti (*Venturia inaequalis*) u količini 5 kg/ha
- *hmelj/mali usev* za suzbijanje pepelnice (*Podosphaera macularis*) u količini 5 kg/ha
- *dinja*, *lubenica*, *bundeva /mali usev* na otvorenom i u zaštićenom (plastični tuneli) prostoru za suzbijanje pepelnice (*Podosphaera xanthii*, *Golovinomyces cichoracearum*) u količini 3 kg/ha

KARBICURE® je fungicid koji ima kontaktno delovanje: potrebno je potpuno prekrivanje biljaka (gornja i donja strana listova). U rastvoru kalijum-bikarbonat oslobađa anjone bikarbonata. Ovo dovodi do povećanja pH rastvora, sa posledičnim povećanjem osmotskog pritiska na površini lista. Time se stvaraju nepogodni uslovi za rast i razvoj gljivičnih spora (deluje na hife i spore gljivičnih prouzrokovala bolesti).

Ne mešati sa folijranim đubrivima, proizvodima EC formulacije i proizvodima kisele reakcije. Moguće je mešanje s proizvodima na bazi bakarnog hidroksida ili bakarnog sulfata.

Karenca: Hmelj 3 dana; svi ostali usevi 1 dan

Pakovanje: 5kg; 50g



PICOCARB

NOVO

Rainbow
all about growing

Sistemični fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovala plamenjače u usevu paradajza

Aktivna materija: Fluopicolid 62.5 g/l + Propamokarb hidrohlorid 625 g/l
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

U usevu **paradajza** za suzbijanje prouzrokovala plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini od 1,2-1,6 l/ha (12-16 ml/100 m²), uz utrošak vode od 200 - 600 l/ha; preventivno, a najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja sa razmakom između dva tretmana 7-10 dana.

Fluopikolid se odlikuje translaminarnim kretanjem od lica ka naličju lista - prožimajući lisno tkivo, a istovremeno se kreće ksilemom (biljnim sokovima naviše). Ima izraženo delovanje na sve gljive iz klase *Oomycetes*, pri čemu snažno deluje na pokretljivost zoospora, zatim klijanje spora i početni rast micelije gljive, kao i na sprečavanje nastanka novih spora (antisporelno delovanje). Ima dugotrajno delovanje.

Propamokarb utiče na sintezu fosfolipida i masnih kiselina ometajući formiranje ćelijskih membrana. Istovremeno ometa rast micelije, kao i produkciju i klijanje spora. Odlikuje ga sistemsko kretanje kroz biljku (stablo i list).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je 4 puta.

Karenca: paradajz 7 dana.

Pakovanje: 1l



WINSTON

NOVO

SC
Sharda Cropchem

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovala čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/lit
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

U zasadu **jabuke** suzbijanje prouzrokovala čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (*Venturia inaequalis*), u količini 1,125 l/ha (11,25 ml na 100 m²) ili 0,375 lit/metru visine krošnje u fazi razvoja cvetova (vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove) do početka faze razvoja plodova.

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem iz hemijske grupe anilinopirimidina. Deluje tako što inhibira biosintezu metionina, čime sprečava stvaranje proteina i deobu ćelija.

Pirimetanil sprečava nastanak bolesti prouzrokovanih širokim spektrom gljiva, uključujući: *Alternaria spp.*, *Botrytis cinerea*, *Cladosporium spp.*, *Colletotrichum spp.*, *Monilinia spp.*, *Mycosphaerella spp.*, *Penicillium spp.* i *Venturia spp.*

Najaktivniji je u fazi cvetanja i precvetavanja, deluje i gasnom fazom tj. parama. Kroz biljku se kreće translaminarno tj. prodire na drugu stranu zelene mase, onemogućava gljivi da sporuliše - izbaci konidije i tako prekida životni ciklus razvoja gljive. Aktivna materija se usvaja već nakon 2 sata od tretiranja.

Jedan od retkih fungicida koji efikasno deluje na nižim temperaturama vazduha, odnosno deluje na temperaturama iznad 6 stepeni. Može se mešati sa većinom preparata osim preparata alkalne reakcije, na bazi sumpora i bordovske čorbe.

Maksimalan broj tretiranja: tri puta, na istoj površini u toku godine sa intervalom između tretmana 5-7 dana

Karenca: 28 dana

Pakovanje: 1 lit



FLUTOZON

NOVO

SC
Sharda Cropchem

Nesistemični akaricid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje običnog paučinara u paradajzu

Aktivna materija: Fenpiroksimat 50 g/lit

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

U usevu **paradajza** u zaštićenom prostoru za suzbijanje običnog paučinara (*Tetranychus urticae*) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi u koncentraciji od 0,1 % (10 ml/10 l vode).

Koristi se za suzbijanje larvi, nimfi i adulta fitofagnih grinja. Najčešće se koristi kasnije tokom vegetacije (za letnja tretiranja). Ispoljava brzo delovanje.

Maksimalan broj tretiranja: jednom, na istoj površini u toku godine.

Utrošak vode: 400 - 600 l/ha (4-6 l/100 m²).

Karenca: Paradajz 7 dana

Pakovanje: 1l, 100 ml



ABAROLE PLUS

NOVO

Rainbow
all about growing

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje moljca paradajza

Aktivna materija: Hlorantraniliprol 45 g/l + Abamektin 18 g/l

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

U usevu **paradajza** u zatvorenom prostoru za suzbijanje moljca paradajza (*Tuta absoluta*) u koncentraciji primene od 0,08 - 0,1 % (8-10 ml u 10 l vode) u vreme pojave prvih gusenica tretiranjem u toku vegetacije.

Abamektin se nakon primene usvaja u list, ali nema kretanja biljnim sokovima, već se aktivna materije deponuje između lica i naličja lista, obezbeđujući dugotrajno delovanje na insekte koji se hrane sisanjem biljnih sokova.

Hlorantraniliprol je aktivna materija sa novim mehanizmom delovanja, ima odlično delovanje na jaja i larve, a kod nekih štetočina i na odrasle insekte. Najbolje vreme primene je pre polaganja jaja i na početku piljenja gusenica. Ima kontaktno i utrobno delovanje.

Karenca: paradajz 3 dana.

Pakovanje: 1l



LASTROLE PLUS

NOVO

Rainbow
all about growing

Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: Lamda-cihalothrin 50 g/l + Hlorantraniliprol 100 g/l

Formulacija: Mešavina koncentrovane suspenzije (SC) i suspenzije kapsula (CS)

Primena:

U usevu **kukuruza** za suzbijanje kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*) u količini primene od 0,2-0,25 l/ha (2-2,5 ml na 100 m²) na početku pojave štetočine, u vreme masovnog leta i na kraju leta kukuruznog plamenca odnosno tretiranjem od pojave četvrtog kolena do voštane zrelosti zrna kukuruza.

U usevu **paradajza** u zaštićenom prostoru za suzbijanje moljca paradajza (*Tuta absoluta*) u količini primene od 0,4 l/ha (4 ml na 100 m²) u vreme pojave štetočina tretiranjem od početka cvetanja do pune zrelosti paradajza.

Karenca: 7 dana za kukuruz, 3 dana za paradajz

Pakovanje: 1 lit, 50 ml



UPAXIAL

Rainbow
all about growing

*Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
za suzbijanje štetočina u voćarstvu*

Aktivna materija: Piriproksifen 100 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:

Piriproksifen pripada grupi regulatora rasta i razvitka insekata. Direktno utiče na hormonski disbalans kod insekata što rezultira sprečavanjem embriogeneze, metamorfoze i formiranja imaga. Najbolja efikasnost se postiže kada se deponit preparata nanese na biljku pre polaganja jaja ili na sveže položena jaja. U tom slučaju dovodi do degenerativnih promena u embrionu čime se sprečava formiranje i piljenje larvi.

- **Jabuka:** za suzbijanje jabukinog smotavca (*Cydia pomonella*) u količini 0,075–0,1 %, uz utrošak vode 600 –1000 l/ha (7,5–10 ml/10 lit vode) u toku vegetacije na početku polaganja jaja.
- **Kruška:** za suzbijanje kruškine buve (*Psylla pyri*) u količini 0,15%, uz utrošak vode 600 –1000 l/ha (15 ml/10 lit vode) u toku vegetacije na početku piljenja larvi.

Karenca: 28 dana za jabuku i krušku

Pakovanje: 1 li



CYDIA PRO SPRAY

NOVO

nii

*Feromon – proizvod za ometanje parenja
i biokontrolu jabukinog smotavca*

Aktivna materija: 30 g/l (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol (3,1% p/p)

Formulacija: Suspenzija kapsula (CS)

Primena:

U zasadu jabučastog voća i oraha.

Cydia Pro Spray® je proizvod koji se koristi za ometanje parenja i biokontrolu jabukinog smotavca (*Cydia pomonella*) u količini 1 lit/ha sa minimalnim razmakom 14 dana između dva tretmana. Deluje tako što izaziva konfuziju i zbunjenost mužjaka jabukinog smotavca. Sadrži mnoštvo pasivnih mikrodizpenzera koji nakon tretmana po vegetaciji (lišće, stablo) progresivno i homogeno oslobađaju feromon u voćnjak. Na početku sezone, preporučuje se upotreba feromonskih klopki unutar i van parcele kako bi se pratio let i pritisak štetočine, ili praćenje saveta prognozno izveštajne službe. U slučaju visokog pritiska štetočina, može se koristiti jedan ili više komplementarnih tretmana insekticidima. U prvoj godini primene preparata, tretman insekticidima na prvu generaciju jabukinog smotavca je obavezan preduslov. U narednim godinama, ovaj tret-

man na prvu generaciju može biti opravdan u slučaju visokog pritiska. Cydia Pro Spray® je najbolje primeniti u roku od 48 sati od prvog ulova u klopka za praćenje. Broj tretmana Cydia Pro Spray®-a treba prilagoditi u skladu sa pritiskom štetočine u voćnjaku.

Preporuke za primenu: Ne prskati tokom najtoplijeg dela dana ili kada se prognoziraju jake kiše.

Kompatibilnost: Cydia Pro Spray® se može primenjivati sa drugim proizvodima za zaštitu bilja. Pre primene sa drugim sredstvima izvršiti proveru mešanja.

Maksimalan broj tretiranja: šest puta, na istoj površini u toku godine (po dva tretmana za svaku generaciju smotavca).

Karenca: bez karence, dozvoljen u organskoj proizvodnji

Pakovanje: 1 lit



VOLLEY 20 SP

W L Willowood Limited

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: acetamiprid 200 g/kg

Formulacija: vodorastvorljivo prašivo (SP)

Preparat **Volley 20 SP** koristi se:

- u zasadu **jabuke**, za suzbijanje: **jabukinog smotavca** (*Cydia pomonella*) i **jabukine zelene lisne vaši** (*Ap-his pomi*) u koncentracijama: **0,0125-0,025%** (1,25-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog smotavca, i **0,02-0,025%** (2-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje vašiju.
- u zasadu **vinove loze** za suzbijanje **žutog** (*Eupoecilia ambiguella*) i **pepeljastog** (*Lobesia botrana*) **grozdovog smotavca**, u koncentraciji **0,025%** (2,5 g u 10 l vode).
- u usevu **krompira** za suzbijanje **krompirove zlatice** (*Leptinotarsa decemlineata*), u količini **0,2-0,25 kg/ha** (2,5 grama na 100 m²).
- u usevu **kupusa** za suzbijanje **kupusove vaši** (*Brevicoryne brassicae*) u količini **0,2-0,4 kg/ha** (2-4 grama na 100 m²).
- u usevu **luka** za suzbijanje **lukovih muva** (*Delia antiqua* i *Napomyza gymnostoma*) u količini **0,2-0,25 kg/ha** (2-2,5 grama na 100 m²).
- u usevu **paradajza** u staklari za suzbijanje **bele leptiraste vaši** (*Trialeurodes vaporariorum*) u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 grama na 100 m²).

Karenca: trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus 14 dana; luk 21 dan; jabuka i vinova loza 28 dana

Pakovanje: 2,5 g ; 25 g ; 100 g ; 250 g ; 1 kg



SOILGUARD 0,5 GR

S C Sharda Cropchem

Kontaktni insekticid sa inhalacionim delovanjem za suzbijanje žičara i kukuruzne zlatice u usevu kukuruza

Aktivna materija: Teflutrin 5 g/kg

Formulacija: granule za direktnu primenu (GR)

Primena:

Primenjuje se za suzbijanje žičara (*Elateridae*) i kukuruzne zlatice (*Diabrotica virgifera*) istovremeno sa setvom kukuruza, deponovanjem u brazde oko semena depozitorima za granule. Količina primene je 15 kg/ha (150 g na 100 m²)

Granule se ne smeju ostavljati na površini zemljišta.

Karenca: obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 20 kg, 1 kg



ARMADA

Rainbow all about growing

Ograničeno sistemski insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: abamektin 18 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Primena:

Preparat ARMADA se koristi u usevu **paradajza** u zatvorenom prostoru za suzbijanje običnog paučina-ra (*Tetranychus urticae*), u koncentraciji primene od

0,05% (5 ml u 10 litara vode), kada se utvrdi prisustvo jedinki pokretnih formi tretiranjem u toku vegetacije.

Karenca: paradajz 3 dana

Pakovanje: 50 ml ; 1 l



KAISO WG



Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: lambda chlotrin 50 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Primena:

Kaiso WG se koristi za uništavanje zelene jabukine vaši (*Aphis pomi*) u zasadu jabuke, žitne pijavice (*Lema melanopus*) u usevu pšenice, kao i mnogih drugih insekata, koji se hrane grickanjem (larve, gusenice i pa-gusenice) i sisanjem (lisne vaši).

Količina primene: 150 – 200 g/ha

Tretiranje se izvodi na početku formiranja kolonija li-snih vaši i u vreme prisustva mladih larvenih uzrasta (na osnovu procene ekonomskog praga štetnosti). Preparat se primenjuje uz utrošak vode 200-400 l/ha za pšenicu, i 600-1000 l/ha za jabuku.

Karenca: jabuka – 14 dana; pšenica – 35 dana

Pakovanje: 150 g, 50 g, 5 g



EMA



Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: Emamektin benzoat 9,5 g/kg
Formulacija: vodorastvorljive granule (SG)

Preparat EMA koristi se u:

- u zasadu **jabuke**, za suzbijanje jabukinog smo-tavca (*Cydia pomonella*) u količini 3 kg/ha, pri-menjuje se u fazi pojave "crne glave" odnosno pred piljenje gusenica, a drugo tretiranje 10-14 dana kasnije.
- u usevu **paprike** za suzbijanje pamukove sovice (*Helicoverpa armigera*) u količini 2 kg/ha, Prvo tretiranje izvesti u vreme pojave prvih gusenica,

pre ubušivanja u plodove, a drugo tretiranje 10-14 dana kasnije.

Karenca: paprika 3 dana; jabuka 7 dana

Pakovanje: 1 kg, 100 g, 25 g



JASSA



Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: acetamiprid 200 g/kg
Formulacija: vodorastvorljive granule (SG)

Preparat JASSA koristi se u:

- u zasadu **jabuke**, za suzbijanje jabukinog smo-tavca (*Cydia pomonella*) u količini 0,25 kg/ha
- u usevu **krompira** za suzbijanje krompirove zla-tice (*Leptinotarsa decemlineata*), u količini 0,25 kg/ha

Karenca: krompir 14 dana; jabuka 28 dana

Pakovanje: 1 kg



LASER 240 SC



Kontaktini insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu

Aktivna materija: Spinosad 240 g/l preparata

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

Primena: Krastavac (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje tripsa (*Frankliniella occidentalis*) u količini **300-400 ml/ha** (3-4 ml/100m²), odmah nakon pojave pokretnih formi

Vinova loza za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (*Lobesia botrana*) u količini **0,008-0,01%** (0.8-1 ml u 10 l vode), pre početka ubušivanja gusenice u bobice

Krompir za suzbijanje krompirove zlatice (*Leptotarsa decemlineata*) u količini **50-100 ml/ha** (0.5-1 ml/100m²), u vreme kada preovlađuju larve I-III stupnja

Jabuka za suzbijanje smotavca (*Cydia pomonella*) u količini od 400 ml/ha, tretiranjem na početku masovnog piljenja larvi, uz utrošak vode **600-1000 lit /ha**.

Malina, jagoda, kupina, borovnica za suzbijanje Azijske voćne mušice (*Drosophila suzukii*), u količini od 0,3 - 0,4 l/ha (3-4 ml na 100m²), tretiranjem od početka

zrenja do faze kada prvi plodovi budu imali specifičnu boju za kultivar, uz utrošak vode 800-1000 l/ha

Trešnja i višnja za suzbijanje Azijske voćne mušice (*Drosophila suzukii*), u količini od 0,4 lit/ha (4 ml na 100m²), tretiranjem na početku menjanja boje ploda, uz utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100 m²)

Pored tripsa u svetu se ovaj insekticid koristi i za suzbijanje **jabukinog smotavca, lisnih minera, lukovog moljca, trešnjine muve, gusenica roda Agrotis (sovice), malinine mušice, malinine mušice galice,...**

Nalazi se na listi insekticida koji mogu da se primenjuju u organskoj proizvodnji.

Karenca: krastavac 3 dana; krompir i vinova loza 14 dana; jabuka 7 dana; malina, kupina, borovnica - 3 dana; jagoda - 1 dan; trešnja i višnja - 7 dana

Pakovanje: 10 ml, 50 ml; 100 ml; 1l



VILOTRIN 10 WP



Biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni

Aktivna materija: lambda cihalotrin 10%

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Primena:

Preparat **VILOTRIN 10 WP** koristi se:

- za suzbijanje **crne** (*Blatta orientalis*) i **smeđe** (*Blattella germanica*) **bubašvabe**, tretiranjem zidova i podova prostorija, u količini **50 grama** na **10 litara** vode uz primenu **40-50 ml/m²**.
- za suzbijanje **žutih mrava** (*Monomorium pharaonis*), tretiranjem zidova i podova prostorija, u količini **50 grama** na **10 litara** vode uz primenu **40 ml/m²**.

- za suzbijanje **kućne** (*Musca domestica*) i **staj-ske** (*Stomoxys calcitrans*) **muve**, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala i staja, u količini **50 grama** na **10 litara** vode uz primenu **50 ml/m²**.
- za suzbijanje **komaraca** tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova objekata, u količini od **50 grama** na **10 litara** vode uz primenu **50 ml/m²**.

Pakovanje: 50 g



AMPLIGO 150 ZC

syngenta

Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: Lamda-cihalothrin (50 g/l) + Hlorantraniliprol (100 g/l)

Formulacija: **ZC** (Smesa formulacije od inkapsulirane suspenzije (CS) i koncentrata za suspenziju (SC))

Primena:

0,20-0,25 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha za kukuruz,

0,4 l/ha za paradajz

Vreme primene

Vreme primene je određeno pojavom kukuruznog plamenca, a određuje se na osnovu ulova leptira na feromonskim klopama ili svetlosnim lampama i prognoze prognozno izveštajnih službi. Najbolje vreme primene je kada se utvrdi maksimalan let leptira, a i do

7-10 dana nakon toga. Ovaj tretman dodatno smanjuje i brojnost pamukove sovice kao i kukuruzne zlatice u narednoj godini. Kako je navedeno, vreme primene je određeno pojavom štetočine, najčešće u fazi razvoja kukuruza BBCH 34-85, ali je prvenstveno određeno pojavom plamenca.

Karenca: 7 dana za kukuruz i kukuruz šećerac, 3 dana za paradajz

Pakovanje: 1l



VELUM PRIME



Sistemični nematocid namenjen za suzbijanje nematoda korenovih gala u zasadima povrća u proizvodnji u zaštićenom prostoru

Aktivna materija: fluopiram 400 g/l

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

Velum Prime koristi se u proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru, u zasadima:

- **paradajza, plavog patlidžana i paprike**, za suzbijanje nematoda korenovih gala (*Meloidogyne* spp.);
- **tikvice, dinje, lubenice, bundeve krastavca i kornišona** za suzbijanje nematoda korenovih gala (*Meloidogyne* spp.);

Količina primene je 0,375-0,625 l/ha (3,75 - 6,25 ml na 100 m²). Prvi tretman treba izvršiti 1-3 dana pre rasađivanja, a drugi 15-30 dana posle rasađivanja. **Utrošak vode** je od 2000-6000 l/ha (20-60 l na 100 m²) kroz zatvoreni sistem za navodnjavanje. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine, sa intervalom od 10 dana između tretmana. Primena preparata Velum Prime može biti trojaka - kap

po kap kroz sistem za navodnjavanje, zalivanjem svake pojedinačne biljke i prskanjem zemljišta (otvorene brazde).

Pored osnovnog, nematicidnog delovanja, Velum Prime ispoljava snažno, dodatno fungicidno dejstvo. Njegova rana primena može pružiti zaštitu povrtarskih useva od pepelnice u trajanju od 30-60 dana. **Velum Prime** je prvi nematocid koji radi povoljnog toksikološkog i ekotoksikološkog profila i primene u količinama koje su desetak puta manje od dosadašnjih proizvođa za istu namenu, predstavlja minimalnu opasnost za operatera i životnu sredinu.

Karenca: paradajz, plavi patlidžan, paprika, tikvica, dinja, lubenica i bundeva - 3 dana; krastavac i kornišon - 1 dan

Pakovanje: 250 ml





JURA



Nesistemični zemljišni insekticid sa kontaktnim i inhalacionim delovanjem za suzbijanje larvi žičnjaka i kukuruzne zlatice

Aktivna materija: Teflutrin 15 g/kg

Formulacija: granule za direktnu primenu (GR)

Primena:

U usevu kukuruza za suzbijanje larvi žičnjaka (*Agriotes sp.*) i kukuruzne zlatice (*Diabrotica virgifera*) u količini 7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m²) tretiranjem istovremeno sa setvom.

Primenjuje se direktno na zemljište prilikom setve deponovanjem u brazdu (inkorporacijom) oko semena pomoću posebnih uređaja (depozitora) za primenu i doziranje granuliranih insekticida na sejalicama. JURA

ima produženo delovanje i do 90 dana posle deponovanja, a ispuštanje pare omogućava bolju difuziju proizvoda u zemljištu.

Na tretiranim površinama ne dozvoliti pristup domaćim životinjama najmanje 28 dana od dana primene. Maksimalan broj tretiranja: Jednom u toku godine, na istoj površini.

Karenca: OVP za kukuruz

Pakovanje: 1 kg, 20 kg



KARACHAR

NOVO



ЩЕЛКОВО АГРОХИМ

Kontaktno-digestivni insekticid namenjen suzbijanju različitih grupa štetočina u širokom spektru useva

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 50 g/lit

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:

U usevu **pšenice** za suzbijanje *L. melanopus* - žitna pijavica u količini od 0,2 l/ha u vreme pojave larvi trećeg stupnja razvoja.

U usevu **uljane repice** za suzbijanje *M. aeneus* - repičin sjajnik u količini 0,25-0,35 l/ha na početku pojave imaga, početkom faze cvetanja.

U usevu **šećerne repe** za suzbijanje *Mamestra sp.* - sovice u količini 0,2 l/ha, pri pojavi larvi četvrtog stupnja razvoja.

Insekticid iz grupe piretroida, deluje na nervni sistem insekata, remeti propustljivost ćelijskih membrana, blokira natrijumove kanale.

Karenca: pšenica 35 dana, uljana repica 42 dana, šećerna repa 14 dana

Pakovanje: 1 lit



NILIPROLE

NOVO



Insekticid sa digestivnim i kontaktnim delovanjem za suzbijanje jabukinog smotavca, kukuruznog plamenca i kukuruzne sovice

Aktivna materija: Hlorantraniliprol 200 g/lit

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:

U zasadu **jabuke** za suzbijanje jabukinog smotavca (*Cydia pomonella*) u koncentraciji 0,016 - 0,02 % uz utrošak vode od 600 - 1000 l/ha, tretiranjem na početku polaganja jaja ili na početku piljenja gusenica

U usevu **kukuruza** za suzbijanje kukuruznog plamenca (*Ostrinia nubilalis*) i pamukove sovice (*Helicoverpa armigera*) u količini 0,1 - 0,15 l/ha uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha.

Ima ovicidno i larvicidno delovanje na sve stadijume larvi, kao i nekih adulta. Paraliza nastupa nakon nekoliko sati, a za potpunu kontrolu je potrebno da prođe 2 - 4 dana. Prouzrokuje aktivaciju receptora rianodina kod insekata, čime se stimuliše otpuštanje kalcijuma

iz unutrašnjih depoa glatkih i poprečno prugastih mišića, izazivajući slabljenje mišićne kontrole, paralizu i na kraju, smrt insekta. Da bi se obezbedio ovicidni (delovanje na jaja) efekat, neophodno je da jaja budu položena na već tretiranu površinu. Posедуje odličnu otpornost na spiranje kišom. Može se mešati sa drugim preparatima. U voćarstvu primeniti ga u 600 do 1000 l/ha, a u ratarstvu i povrtarstvu u 200-400 l/ha tečnosti.

Maksimalan broj tretiranja: dva puta, na istoj površini u toku godine.

Karenca: 14 dana

Pakovanje: 100 ml





SILWET® L-77



*Univerzalni organosilikonski superokvašivač
za pesticide i folijarna đubriva*

Aktivna materija: Trisiloksan

Primena:

Preporučena koncentracija za Silwet® kreće se od 0,01%–0,15%, sa maksimalnom količinom primene od 0,3 l/ha. U ratarskim usevima najčešća količina primene je **0,1 l/ha** uz upotrebu **100–200 l/ha vode**. Veća količina Silweta ne poboljšava efekat, već postoji opasnost da se upotrebljeni pesticidni rastvor slije niz biljku.

Pakovanje: 100 ml ; 1l



INEX



Pomoćno sredstvo (okvašivač) za primenu sa pesticidima

Aktivna materija: etoksilat masnih alkohola 20,3%
polidemetilsiloksan 1,0%

INEX je nejonski okvašivač, penetrator i aktivator. Poboljšava delovanje kontaktnih i sistemskih sredstava za zaštitu bilja (fungicidi, insekticidi, herbicidi, akaricidi, desikanti), kao i folijarne prihrane, povećavajući njihovu apsorpciju i translokaciju.

INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji **ne peni i uklanja postojeću penu**, formulisan posebno za poboljšanje performansi većine pesticida.

Primena:

Fungicidi 0,5–0,75 ml/l vode (50–75 ml / 100 l vode)

Herbicidi 0,75–1,0 ml/l vode (75–100 ml / 100 l vode)

Vreme primene, karenca, radna karenca, kao i ostala ograničenja zavise od pesticida sa kojim primenjujemo INEX.

Pakovanje: 100ml, 1l



FUROS TWIN (F1 + NEM 2)



Mikrobiološko neorgansko đubrivo

F1 – Mycorrhizae -Trichoderma spp1 × 10⁶ x g-1

Rhizosphaera bacteria- 0,5 × 10⁸ x g-1

NEM 2 – Gvožđe (Fe) rastvoreno u vodi – 2,0% p/p

Osobine i način delovanja

Furos Twin (F1 + Nem 2) je mešavina različitih komponenti koje mogu podstaći brz razvoj korenovog sistema i snažan rast cele biljke. Primena ovog đubriva omogućava da se biljka na najbolji način bori protiv štete izazvane biotičkim i abiotičkim negativnim faktorima (biljne bolesti, insekti, nematode, stres životne sredine,...). Posebno je izražen uticaj na smanjenje broja nematoda u zemljištu. Furos Twin je đubrivo ali je u ogledima pokazao bolji uticaj na smanjenje broja nematoda od nekih klasičnih nematocida.

Primena:

Jagode, povrće: po presađivanju u dozi od 1,5–2 l/1000m². Ponoviti tretman posle 4 nedelje u dozi od 1–1,5 l/1000m². Na kulturama dužeg ciklusa razvoja potrebno je primeniti još jednu treću aplikaciju, posle 4–6 nedelja, u dozi od 1–1,5 l/1000m².

Šargarepa, krompir, industrijski paradajz: dve aplikacije u dozi od 10–15 l/ha. Prvi tretman posle rasađivanja, drugi tretman 3–4 nedelje kasnije (paradajz i šargarepa, krompir). Ovi tretmani mogu biti u kombinaciji sa herbicidima.

Za primenu u saksiji ili kontejner gajenim kulturama 10–15 ml/ biljci.

Napomena: upotreba pesticida (fungicidi, nematocidi, insekticidi) može dovesti do promene mikrobioloških svojstava proizvoda što dovodi do ometanja i gubitka efikasnosti. Preporučujemo da se izbegne hemijska primena u mešavini i treba da se napravi pauza između primene pesticida i Furos Twin-a najmanje 7 dana.

Nema karenca i nema uticaja na plodored.

Pakovanje: 1 lit, 5 lit

Programi zaštite

PŠENICA

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Od sredine boko- renja do pojave drugog kolenca	abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatula, pomoćnica, palamida, divlja paprika, pepeljuga, gorušica, veronika...	Dicopur Top 464 SL	1 l/ha
Pojava lista zastavičara	prilepača (Galium), poponac, divlja kupina, pomoćnica, tatula, ambrozija, čičak, abutilon, palamida...	Flurocap + Mezzo 60 WG + Inex (okvašivač)	0,6 l/ha + 10 g/ha + 0,2 l/ha
	bolesti lista i stabla (pepelnica, rđa, pegavost)	Sharteb + Silwet L 77	1 l/ha + 0,05 – 0,1 l/ha
	larve žitne pijavice (Lema)	Kaiso WG	150 g/ha
Početak cvetanja	Fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla	Elatus Era + Silwet L 77	0,8 l/ha + 0,05 – 0,1 l/ha
Suzbijanje korova na strništu	Totalno suzbijanje svih korova	Kyleo	3-5 l/ha

KUKURUZ

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Posle setve a pre nicanja kukuruza	semenski sirak, muhar, štir, pepeljuga,...	Sunward	0,4 l/ha
Posle nicanja od 2 – 5 lista kukuruza	abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatula, pomoćnica, palamida, divlja paprika, pepeljuga, gorušica...	Dicopur Top 464 SL ili Basico	1 l/ha ili 0,7 l/ha
Posle nicanja od 2 – 6 lista kukuruza	divlji sirak iz rizoma, muhar	Astral 40 OD	1 – 1,25 l/ha
Posle nicanja do 8 lista kukuruza	abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatula, pomoćnica, palamida, dvornici, pepe- ljuga, gorušica...	Tembone Xtra + Inex	1,5 – 2 l/ha + 0,2 l/ha
7-10 dana nakon max leta leptira	Kukuruzni plamenac	Ampligo	0,2 – 0,25 l/ha

SOJA

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Posle setve a pre nicanja	semenski sirak, muhar, štir, pepe- ljuga, gorušica, ambrozija, tatula, abutilon, dvornici, loboda...	Lord 70 WDG + Stealth	0,3 – 0,4 kg/ha + 1,4 l/ha
Posle nicanja soje (soja u fazi od 1 – 3 tropoliske)	divlji sirak iz rizoma, pirevina	Fargo Extra	0,4 – 1 lit/ha
Posle nicanja soje (soja u fazi od 1 – 3 tropoliske)	štir, pepeljuga, gorušica, tatula, abutilon, čičak, lubeničarka, dvor- nici, prilepača...	Aladin + Moxbet	2 l/ha + 1 l/ha

Programi zaštite

SUNCOKRET

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Posle setve a pre nicanja	semenski sirak, muhar, štir, pepe- ljuga, pomoćnica, gorušica, ambro- zija, tatula, dvornik, vijušac njivski, čičak...	Stealth + Shican	1,4 lit/ha + 0,25 lit/ha
Folijarno suzbijanje korova	divlji sirak iz rizoma, pirevina	Fargo Extra	0,4 – 1 lit/ha

ŠEĆERNA REPA

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Folijarno suzbijanje korova	palamida, ambrozija, čičak, samonikli suncokret...	Lontrel 300	0,2 – 0,3 l/ha
	abutilon, štir, dvornici, gorušica, po- moćnica...	Apex 50 WG + Inex	30 g/ha + 0,1 l/ha
	vilina kosica	Kerb Flo	4 lit/ha
	divlji sirak iz rizoma, pirevina	Fargo Extra	0,4 – 1 lit/ha
Preventivno ili po pojavi prvih simptoma	siva pegavost lista – cercospora	Adiconstar + Champ DP + Silwet L 77	1 l/ha + 2 kg/ha + 0,05 – 0,1 l/ha

KROMPIR

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Posle sadnje, a pre nicanja	širokolisni korovi	Lord 700 WDG	0,75 – 1 kg//ha
Posle nicanja (porast krompira do 25 cm)	širokolisni korovi uskolisni korovi (rizomski sirak) plamenjača	Lord 700 WDG Fargo Extra Cimoram	0,5 – 0,75 kg/ha 0,4 – 1 l/ha 3 kg/ha
Zatvaranje redova	plamenjača krompirova zlatica	Picocarb Armada	1,5 l/ha 0,75 l/ha
Jasno izdvojene cvasti	plamenjača krompirova zlatica	Rival DUO Volley 20 SP	2,5 l/ha 0,25 kg/ha
Puno cvetanje	plamenjača krompirova zlatica	Picocarb Volley 20 SP	1,5 l/ha 0,25 kg/ha
Precvetavanje	plamenjača krompirova zlatica	Rival DUO Volley 20 SP	2,5 l/ha 0,25 kg/ha
Nalivanje krtola	plamenjača	Cimoram	3 kg/ha

JABUKA

Namena	Preparat	Količina primene
bakteriozna plamenjača, čadava pegavost i krastavost, plavo prskanje	Champ DP	2 kg/ha
čadava pegavost i krastavost	Shanon	0,7 kg/ha
	Ambasador	0,15 l/ha
	Shub 80 WG	1,8 kg/ha
	Sharteb	0,7 l/ha
	Kingkong Xtra	0,2 – 0,3 kg/ha
	Winston	1,125 l/ha
	Preguard	0,6 – 1 l/ha
pepelnica	Cyflamid	0,5 l/ha
lisne vaši, lisni mineri	Volley 20 SP	0,25 – 0,4 kg/ha
jabukin smotavac	Volley 20 SP	0,25 – 0,4 kg/ha
	Ema	3 kg/ha
	Niliprole	0,2 l/ha
suzbijanje korova	Valesure	0,15 – 0,2 kg/ha

VINOVA LOZA

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Lastari dužine 3 – 10 cm	crna pegavost eriofidne grinje	Fighter Armada	2 kg/ha 1 l/ha
Lastari dužine 20 – 30 cm	plamenjača pepelnica eriofidne grinje	Cimoram Sharteb Armada	3 l/ha 0,4 l/ha 1 l/ha
Pred cvetanje	plamenjača pepelnica	Cimoram Cyflamid	3 l/ha 0,5 l/ha
Precvetavanje	plamenjača pepelnica cikade	Pergado F Cyflamid	2,5 kg/ha 0,5 l/ha
Kraj juna	plamenjača pepelnica groždani moljac	Pergado F Sharteb Volley 20 SP	2,5 kg/ha 0,4 l/ha 0,25 kg/ha
Polovina jula	plamenjača pepelnica groždani moljac	Pergado F Sharteb Volley 20 SP	2,5 kg/ha 0,4 l/ha 0,25 kg/ha
Početak šarka	plamenjača	Champ DP	2 kg/ha



Semena ratarских useva



agrimatco

Suncokret	36
Kukuruz	38
Pšenica, ječam	41
Soja	44
Sirak	45
Uljana repica	46



IOLEN

NOVO



- Srednje rani hibrid
- Stablo je čvrsto i srednje visoko
- Formira glavice srednje veličine
- Visok potencijal za prinos
- Sadržaj ulja (48 – 50 %)
- Tolerantan na sve značajne bolesti suncokreta
- Preporuka za setvu:
62,000 – 65,000 biljaka po hektaru



Nemo S SU



- **Hibrid tolerantan na aktivnu materiju tribenuron-metil**
- Srednje rani hibrid
- Srednje visoko stablo
- Semena srednje krupnoće i sadržaja ulja
- Visok potencijal za prinos
- Visoka tolerantnost na sušne i toplice uslove
- Tolerantan na volovod
- Tolerantan na najznačajnije bolesti suncokreta (*Plasmopara*, *Phomopsis*, *Sclerotinia* glave i korena)
- Preporučeni sklop: 62.000 – 68.000 biljaka po ha (21-23 cm)



RGT Interstellar SU



- **Hibrid tolerantan na aktivnu materiju tribenuron-metil**
- Srednje rani hibrid
- Srednje visoko stablo
- Blago pognute glave
- Brz početni porast
- Dobra oplodnja
- Otporan na volovod A-E
- Tolerantnost na najznačajnije bolesti suncokreta
- Sadržaj ulja (48-49%)
- Preporuka za setvu: 62,000 – 65,000 biljaka po hektaru




RGT Vallencia CLP – visok potencijal rodosti



- **Hibrid tolerantan na aktivnu materiju imazamoks**
- Srednje rani hibrid
- Visoko tolerantan na poleganje
- Srednje visoko stablo
- Tolerantan na najznačajnije bolesti suncokreta
- Sadržaj ulja (48-49%)
- Dobar rani vigor
- Preporučeni sklop:
62,000 – 65,000 biljaka po hektaru





Rezultati ogleda suncokreta - PSS 2025

Lokalitet/Izvođač	Semenska kuća	Hibrid	Vlaga (%)	Prinos (kg/ha)
PSS Jagodina	RAGT Semences	Vallencia CLP	8.7	1,116
PSS Kikinda	APSOV - Agrimatco	Nemo SU	8.9	3,417
	RAGT Semences	Interstellar SU	9.9	3,508
	RAGT Semences	Vallencia CLP	9.8	3,447
PSS Novi Sad	APSOV - Agrimatco	Nemo SU	6.3	2,952
	RAGT Semences	Interstellar SU	6.1	3,003
	RAGT Semences	Vallencia CLP	6.6	3,121
PSS Sombor	RAGT Semences	Interstellar SU	6.9	2,679
	RAGT Semences	Vallencia CLP	10.6	2,807
PSS Zrenjanin	APSOV - Agrimatco	Nemo SU	6.3	2,980
	RAGT Semences	Interstellar SU	9.2	2,634
	RAGT Semences	Vallencia CLP	12.8	2,744

Rezultati proizvodnje i ogleda suncokreta 2025

Izvođač	Lokalitet	Hibrid	Prinos SRPS kg/ha
PG Dušan Žikelić	Gospođinci	Nemo SU	3,344
		Interstellar SU	2,756
PG Vasić Miroslav	Pećinci	Interstellar SU	4,050

RGT Reaxxion

FAO 290



- Visok potencijal rodnosti za svoju grupu zrenja
- Veoma dobra čvrstoća stabla sa erektofilnim listovima
- Srednje postavljeni klipovi
- Brz rani porast i rano cvetanje
- Pogodan i kao postrni usev za silažu i zrno
- Broj redova: 16-18
- Broj zrna u redu : 30-34
- Masa 1000 zrna : 320-340 gr
- Preporučeni sklop : 79.000 – 84.000 biljaka po ha (17-18 cm)

Futurixx

FAO 400



- Dobro podnosi stresne uslove gajenja i daje stabilan prinos
- Niska vlaga u berbi
- Odlikuje se brzim početnim porastom
- Odlična oplodnja i teški klipovi
- Broj redova: 18-20
- Broj zrna u redu: 32 - 34
- Masa 1000 zrna: 330-350 gr
- Preporučeni sklop: 75.000 – 79.000 biljaka po ha (18-19 cm)

RGT Lexxypol

FAO 410



- Visok potencijal rodnosti
- Veoma dobra čvrstoća stabla sa erektofilnim listovima
- Srednje visoko postavljeni klipovi
- Dobra oplodnja
- Pogodan za sve tipove zemljišta
- Broj redova: 18-20
- Broj zrna u redu: 30-34
- Masa 1000 zrna: 320-340 gr
- Preporučeni sklop: 75.000 – 79.000 biljaka po ha (18-19 cm)

RGT Produxxion

FAO 420



- Dobar rani vigor
- Srednje visoka biljka sa srednje visoko postavljenim klipom
- Visok potencijal za prinos i u slabijim uslovima gajenja
- Dobro otpuštanje vlage
- Visoka tolerantnost na poleganje
- Broj redova : 18-20
- Broj zrna u redu : 34-38
- Masa 1000 zrna : 310-340 gr
- Preporučeni sklop : 68,000 – 72,000 biljaka po ha (20 – 21 cm)

RGT Ixxel

NOVO**FAO 500**

- Formira velike i zdrave klipove
- Visina formiranja klipa je srednje
- Posедује dobar rani vigor
- Tolerantan na lošije uslove gajenja
- Dobro otpuštanje vlage
- Broj redova: 18-20
- Broj zrna u redu: 34-36
- Masa 1000 zrna: 350-370 gr
- Preporučeni sklop: 68,000 – 72,000 biljaka po ha (20-21 cm)

RGT Ixabel

FAO 650

- Visoka i atraktivna biljka sa krupnim klipovima
- Hibrid kasnijeg zrenja za branje u klipu
- Pogodan za silažu zbog izbalansiranog odnosa zrna i zelene mase
- Visoka tolerantnost na poleganje
- Broj redova: 20-24
- Broj zrna u redu: 45-50
- Masa 1000 zrna: 450-550 gr
- Preporučeni sklop: 55.000 – 65.000 biljaka po ha (22-25 cm)

Rezultati ogleda kukuruza - PSS 2025.

Lokalitet / Izvođač	Hibrid	Prinos (kg/ha)	Vlaga (%)
PSS Sombor	Produxxion	11.7	4,767
	Lexxypol	13.2	4,085
	Ixxel	12.5	4,360
PSS Kikinda Kinda	Produxxion	13.7	4,368
	Lexxypol	12.9	4,105
	Ixxel	14.1	3,746
	Ixabel	15.8	3,820
PSS Subotica	Produxxion	17.3	3,480
	Lexxypol	15.2	3,491
	Ixabel	23.8	2,935
PSS Novi Sad	Produxxion	20.4	6,292
	Lexxypol	16.4	6,608
	Ixxel	22.5	6,970
PSS Zrenjanin	Produxxion	12.0	2,868
	Lexxypol	12.1	2,228
	Ixabel	16.5	2,016
PSS Jagodina	Produxxion	17.5	1,339
	Lexxypol	17.6	1,666
	Ixabel	17.2	1,615

► **Rezultati proizvodnje i ogleda kukuruza - 2025.**

Izvođač	Lokalitet	Hibrid	Prinos (kg/ha)	Vlaga (%)
Salcorp	Vrbas	Lexxypol	2,858	15.0
		Futurixx	2,921	12.7
		Produxxion	2,858	13.5
Kovač Kapolč	Male Pijace	Lexxypol	2,789	13.9
		Produxxion	2,794	13.2
		Futurixx	2,438	13.4
Nikola Stanković	Zmajevo	Lexxypol - N= 0 kg	5,130	13.5
		Lexxypol - N= 70 kg	5,202	13.5
		Lexxypol - N= 140 kg	5,040	13.5
		Lexxypol - N= 140 kg	4,572	13.5
		Lexxypol - N= 70 kg	5,292	13.5
		Lexxypol - N= 0 kg	5,688	13.5
Ivan Oračić	Bikovo	Reaxxion	2,950	13.5
		Lexxypol	3,175	14.0
		Futurixx	3,098	13.8
		Ixabel	3,190	16.5
Mirko i Vladimir Hlatki	Indija	Reaxxion	6,217	12.0
		Futurixx	4,651	12.0
		Lexxypol	6,069	13.0
		Produxxion	6,236	12.4
Vioerel Gereu	Torak	Lexxypol	4,032	13.5
		Produxxion	4,150	13.9
		Futurixx	4,090	14.1
Zoran Donić	Donja Livadica	Lexxypol (zalivano - tifon)	4,050	14.6
Slavomir Janjić	Velika Plana	Lexxypol (zalivano - kap po kap)	8,750	14.2
Milka Ružičić	Goračići	Futurixx	5,770	14.8
		Produxxion	5,200	14.3
Vladimiri Munjić	Kosjerić	Produxxion	5,100	14.5

Yetti



- Ostvaruje visoke prinose u svim obalstima gajenja
- Ranostasnost u kombinaciji sa visokim prinosom
- Visoko tolerantna na poleganje
- Formira visoko produktivne klasove sa krupnim zrnima
- Dobro podnosi niske temperature tokom zime



- Visina biljke: 90 - 95 cm
- Sadržaj proteina: 12 - 14 %
- Hektolitarska masa: 80-85 kg/hl
- Setvena norma: 400 - 500 kljavih zrna po m²

RGT Sacramento



- Srednje rana osjata sorta sa visokim potencijalom rodnosti
- Biljke su srednje visine i veoma tolerantni na poleganje
- Posедуje dobre mlinsko-pekarske osobine
- Dobro bokorenje i brz porast



- Visina biljke: 85-90 cm
- Sadržaj proteina: 12 - 14 %
- Hektolitarska masa: 80 - 85 kg/hl
- Setvena norma: 400 - 500 kljavih zrna po m²

RGT Venezio



- Pšenica bogata proteinima
- Ujednačeno sazrevanje klasova na kraju vegetacije
- Osjata sorta
- Srednje rana, veoma tolerantna na poleganje
- Dobro podnosi niske temperature i bez snežnog pokrivača



- Visina biljke: 80-90 cm
- Sadržaj protein: 13-15%
- Hektolitarska masa: 80-85 kg/hl
- Setvena norma: 400-500 zrna po m²

Algeri



- Srednje rana ozima pšenica vrhunskog kvaliteta za hleb
- Osjata sorta
- Visoko prinosa sorta sa dobrom tolerancijom na *Fusarium spp*
- Visina stabla : srednja
- Otporna na poleganje



- Visoko tolerantan na značajne bolesti (pepelnica, lisna rđa, žuta rđa, septoria, fuzarium)
- Masa 1000 zrna 40-42 g
- Hektolitarska masa: 81-83 kg/hl
- Sadržaj proteina - dobar
- Setvena norma : 400-450 zrna/ m² ili 180-200 kg/ha



- Rani šestoredni ozimi ječam
- Visoko tolerantan na značajne bolesti (virus mozaika, virus patuljivosti, pepelnica, Helminthosporium)
- Srednje-visoko do visoko stablo tolerantno na poleganje
- Masa 1000 zrna 39-43 g
- Hektorlitaraska masa: 65-67 kg/hl
- Sadržaj proteina – srednji
- Setvena norma : 300-350 zrna/m² ili 160-170 kg/ha

Rezultati ogleda pšenice sa PSS 2024/2025.

Izvođač / Lokalitet	Sorta	Biljna vrsta	kg/hL	Prinos (kg/ha)
PSS Jagodina	Fenice	ozimi ječam	67.3	1,900
	Algeri	ozima pšenica	74.4	4,566
	Yetti	ozima pšenica	74.5	4,126
PSS Kikinda	Fenice	ozimi ječam	65.4	7,037
	Algeri	ozima pšenica	73.4	6,328
	Sacramento	ozima pšenica	73.5	6,205
	Venezio	ozima pšenica	78.1	6,070
	Yetti	ozima pšenica	75.4	6,057
PSS Novi Sad	Fenice	ozimi ječam	x	8,632
	Algeri	ozima pšenica	x	8,648
	Sacramento	ozima pšenica	x	8,756
	Venezio	ozima pšenica	x	8,979
PSS Subotica	Fenice	ozimi ječam	64.2	7,174
	Algeri	ozima pšenica	78.0	8,003
	Sacramento	ozima pšenica	75.5	7,743
	Venezio	ozima pšenica	76.5	8,107
	Yetti	ozima pšenica	74.7	6,981
PSS Zrenjanin	Fenice	ozimi ječam	57.9	6,414
	Algeri	ozima pšenica	77.2	7,285
	Venezio	ozima pšenica	73.7	7,160
	Sacramento	ozima pšenica	72.6	7,043
PSS Sombor	Fenice	ozimi ječam	x	8,042
	Algeri	ozima pšenica	x	7,775
	Venezio	ozima pšenica	x	8,840
	Yetti	ozima pšenica	x	8,428
	Sacramento	ozima pšenica	x	8,332

Rezultati proizvodnje i ogleda ozime pšenice 2024/2025.

Izvođač, Lokalitet	Sorta	Biljna vrsta	Prinos (kg/ha)	hl/t	Prote-in %	Gluten %
Lučić Milenko, Vrbas	Algeri	pšenica	7,525	84.2	15.0	30.8
Senderak Vladimir, Vrbas	Algeri	pšenica	8,500	84.2	14.7	30.6
Kapolč Kovač, Male Pijace	Algeri	pšenica	6,404	77.9	15.2	32.5
	Venezio	pšenica	5,855	72.7	15.6	32.3
	Sacramento	pšenica	5,588	70.6	15.7	32.4
Buranj Kristijan, Senta	Algeri	pšenica	7,354	78.9	14.1	34.7
	Venezio	pšenica	7,063	74.9	14.7	36.0
	Sacramento	pšenica	7,013	74.0	13.2	33.7
Fodor Jan, Selenča	Yetti	pšenica	8,949	x	x	x
Benjamin Salčak, Pivnice	Venezio	pšenica	8,729	x	x	x
Vioerel Ghereu, Torak	Sacramento	pšenica	7,059	x	x	x
	Venezio	pšenica	7,164	x	x	x
	Algeri	pšenica	7,198	x	x	x
Goran Pavlović, Filić	Yetti	pšenica	5,480	x	x	x
	Venezio	pšenica	5,865	x	x	x
	Sacramento	pšenica	6,005	x	x	x
Peko Dapčević, Vojvoda Stepa	Algeri	pšenica	6,950	x	x	x
	Yetti	pšenica	6,250	x	x	x
	Sacramento	pšenica	6,705	x	x	x
	Venezio	pšenica	7,090	x	x	x



Soja

Benedetta



- Soja prve grupe zrenja
- Visina stabla – srednje visoka
- Grananje – srednje intenzivno
- Položaj prvih mahuna – visoko
- Otpornost na poleganje: visoka
- Masa 1000 zrna 160-190 g
- Sadržaj proteina: srednji
- Setvena norma : 450-500 zrna/ m² ili 90-95 kg/ha

Svelte



- Soja nulte grupe zrenja
- Visina stabla – srednje visoka
- Grananje – srednje intenzivno
- Položaj prvih mahuna – visoko
- Otpornost na poleganje: visoka
- Masa 1000 zrna 150-170 g
- Sadržaj proteina: srednji
- Setvena norma : 450-500 zrna/ m² ili 90-95 kg/ha



Sirak

RGT Amiggo



- Klasičan silažni hibrid
- Visok prinos zelene mase
- Izrazito visoka biljka, 3,5 – 4,5 m
- Visoka tolerantnost na poleganje
- Zrna bez tanina

- Tolerantan na bolesti i na sušne uslove
- Boja zrna: crveno
- Masa 1000 zrna: 28-32 gr
- Preporučeni sklop: 280,000 -350,000 klijavih zrna po ha

RGT Vegga



- Sirak za silažu
- Lako i brzo siliranje
- Zrna bez tanina
- Izrazito visoka biljka, 1,5 – 2,0 m
- Tolerantan na bolesti
- U sušnim uslovima idalna zamena za kukuruz
- Boja zrna: bela

- Masa 1000 zrna: 28-32 gr
- Preporučeni sklop: 250,000 -300,000 klijavih zrna po ha



Uljana repica

RGT Nizza CL



- Visina biljke: niska
- Rani vigor: izvanredan
- Potencijal za formiranje stabla u jesen: niska
- Tolerantnost na zimu: srednja
- Pucanje mahuna: nisko
- Cvetanje: rano
- Dužina vegetacije: rana
- Sadržaj ulja i proteina: visok
- Sadržaj glikozinolata: ispod granice tolerancije
- Preporučeni sklop u setvi: 45-55 klijavih zrna po m²
- Optimalno vreme setve: 25/08 - 20/09



RGT Blackmoon

NOVO



- Visina biljke: srednje visoka
- Rani vigor: izvanredan
- Potencijal za formiranje stabla u jesen: srednji
- Tolerantnost na zimu: dobra
- Čvrstoća stabla: dobra
- Mogućnost pucanja mahuna: niska
- Otpornost na *Phoma*: izvanredna
- Otpornost na *Sclerotinia* : dobra
- Opšta otpornost : dobra
- Sadržaj ulja: srednji
- Sadržaj proteina: visok
- Sadržaj glikozinolata: ispod granice tolerancije
- Masa 1000 zrna: srednja
- Optimalan sklop u proleće: 35 - 45 biljaka/m²
- Optimalan sklop u setvi: 40 - 55 klijavih zrna/m²
- Optimalno vreme setve: 25/08 - 20/09



Rezultati ogleda uljane repice 2024/2025.

Izvođač	Lokalitet	Hibrid	Prinos SRPS kg/ha
Kovač Armin	Male Pijace	RAGT Nizza CL	3.132
Kovač Kapolč	Male Pijace	RAGT Nizza CL	3.185
ZZ Veljko Lukić Kurjak	Lukićevo	RAGT Nizza CL	3.778
OZZ Lovrenac	Mladenovo	RAGT Nizza CL	3.900



Veterina



agrimatco

 **LIVISTO**

 **cenavisa**


ALPHATECH

 **INTERMAG**

Nouryon
AkzoNobel

 **GIGI**

DOXYPREX 100 mg/g

NOVO

LIVISTO



Premiks za mediciniranu hranu (za svinje).
Protektirani doksiciklin, ne ostavlja rezidue u opremi za umešavanje u hranu.

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca: Doksiciklin 100 mg (u obliku doksiciklin-hiklata)

Pomoćne supstance: Pšenični griz q.s.

Ostale pomoćne supstance: sorbitol, tečni, nekristališući; parafin, tečni, laki.

Granule žute boje.

Doza: 2,5 kg na tonu hrane

Proizvod se može peletirati (pogledati uputstvo za lek)

Karenca: Meso i jestiva tkiva : 7 dana

Pakovanje: 25 kg

BOFLOX

LIVISTO



Sastav: Marbofloxacin 100mg/ml, rastvor za injekciju; za goveda i svinje.

Lečenje brojnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na marbofloxacin kod goveda i svinja (krmače).

Karenca:

Meso i iznutrice: – goveda:

3 dana (8 mg/kg t.m., i.m., jednokratno)

6 dana (2 mg/kg t.m., i.m. ili s.c., jednom dnevno, 3–5 dana)

– svinje: 4 dana

Mleko

72 časa (8 mg/kg t.m., i.m., jednokratno), 36 časova (2 mg/kg t.m., i.m. ili s.c., jednom dnevno, 3–5 dana).

Pakovanje: 100ml

Menbutil

LIVISTO



Sastav:

1ml rastvora za injekciju sadrži aktivnu supstancu Menbuton 100mg.

Stimulacija hepato-digestivne aktivnosti u slučaju digestivnih poremećaja i insuficijencije jetre. *Telad (do 6 meseci), ovce, koze i svinje:* 1ml rastvora za injekciju na 10kg t.m. duboko i.m. ili

sporo i.v. *Goveda:* 1ml rastvora za injekciju 15–20kg t.m. sporo i.v. *Konji:* 1ml rastvora za injekciju na 20–40kg t.m. sporo i.v.

Karenca: meso i jestiva tkiva: 3 dana;

Mleko: 1 dan

Pakovanje: 100ml

Aluminijum sprej

LIVISTO



Sastav:

Sadrži koloidni Aluminijum za zaštitu rana od spoljnih infekcija stvaranjem zaštitne barijere

Upotrebljava se kod životinja za zaštitu oštećenih površina na koži stvaranjem tanog fleksibilnog filma, dozvoljavajući koži da diše. Formirana barijera štiti ranu od infekcije i drugih spoljnih uticaja.

Karenca: nema

Pakovanje: 200 ml

VIGOPHOS 100ml



Sastav: 1 ml rastvora za inj. sadrži:

- butafosfan 100 mg
- cijanokobalamin (Vit. B12) 0,05 mg

Upotreba: za potpurnu terapiju sekundarne ketoze kod goveda

Karenca: nema

Pakovanje: 100 ml



QIVITAN 25 mg/ml



Suspenzija za injekciju za goveda i svinje

Aktivna supstanca: Cefkvinom 25,0 mg (ekv. 29,64 mg cefkvinom-sulfata)

INDIKACIJE: Lečenje infekcija uzrokovanih Gram-pozitivnim i Gram-negativnim bakterijama, osetljivim na cefkvinom, kod goveda i svinja.

Odrasle jedinke:

- respiratorne infekcije, uzrokovane bakterijama *P. multocida* i *M. haemolytica*.

- digitalni dermatitis, infektivna bulbarna nekroza i akutna interdigitalna nekrobaciloza (interdigitalna flegmona),
- akutni mastitis uzrokovan bakterijom *E. coli* sa znacima sistemske bolesti.
- MMA sindrom, uzrokovan bakterijama *E. coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* i drugim mikroorganizmima osetljivim na cefkvinom.

KARENCA: *Goveda:* meso i jestiva tkiva: 5 dana, mleko: 24 sata; *Svinje:* meso i jestiva tkiva: 3 dana

Promectine



Sastav: 1ml rastvora za injekciju sadrži aktivnu supstancu Ivermektin 10mg

Lečenje i kontrola infekcija izazvanih želudačno-crevnim parazitima, plućnim parazitima, štrkljevima, šugarcima i vašima kod goveda, svinja i ovaca.

Goveda i ovce: jednokratno s.c. 1ml/50kg t.m. *Svinje:* jednokratno s.c. 1, 5ml/50kg t.m.

Karenca: (meso i iznutrice)

Goveda: 49 dana; *ovce* 42 dana; *svinje:* 28 dana; *Mleko nije za ljudsku upotrebu.*

Pakovanje: 50ml, 100ml, 250ml;

EAR CLEANER ALOE VERA za pse i mačke



Koristiti za redovno čišćenje ušiju.

Sadrži ekstrakt nevena sa antiupalnim efektom i Aloe vera sa emolijentnim i umirujućim svojstvima.

- fleksibilni dozator kanile za lakšu primenu
- ne sadrži paraben
- neutrališe mirise

Pakovanje: 125 ml

SEBO GLUCOZINC SPRAY za pse i mačke



Hrani i stabilizuje strukturu kože.

Sa Glukonolaktonom poznatim po svojim keratolitičkim, keratoplastičnim, hidrirajućim i antioksidativnim dejstvom.

Sa cinkom, idealnim za balansiranje flore kože i ceramidima za obnavljanje kožne barijere.

Aloe vera sa umirujućim dejstvom i neven sa antioksidativnim delovanjem neutrališu slobodne radikale.

Pakovanje: 125ml

ATOPIC PREBIOTIK SPREJ za pse i mačke



Prebiotik sprej podstiče obnavljanje i balansiranje kožne barijere. Pogodan za negu i smirenje osetljive, iritirane i suve kože. Sadži prebiotike za jačanje mikrobioma kože, hijaluronsku kiselinu i glicerol za dobru hidrataciju kože i neven sa antiupalnim i antioksidativnim svojstvima.

Pakovanje: 125ml

OXICARE CREAM za pse i mačke



Doprinosi formiranju optimalnog vlažnog mikrookruženja za dobru reepitalizaciju kože (za brže zarastanje rana). Ima dubinski efekat protiv slobodnih radikala, mehaničko, zaštitno i osmotsko dejstvo. Sadrži prirodne antioksidanse kao što su proantocijanidin divljeg kestena, crnog luka, kvercetin i vitamin E, za borbu protiv slobodnih radikala.

Pakovanje: 30 ml

TULLAVIS 100 mg/ml



Rastvor za injekciju za goveda, svinje i ovce

Aktivna supstanca: Tulatromicin 100,0 mg

INDIKACIJE: *Goveda i svinje:* Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti goveda (BRD-RBG) i svinja (SRD-RBG); *Ovce:* Lečenje ranih stadijuma infektivnog podo-

kovanih virulentnom bakterijom *D. nodosus*, koji zahteva sistemski tretman.

KARENCA: goveda 22 dana, svinje 13 dana, ovce 16 dana

Upotreba leka nije odobrena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne daje se gravidnim životinjama 2 meseca pre partusa, ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi.

Cenvimox 500

cenavisa



Sastav: 1g praška za oralni rastvor sadrži aktivnu supstancu Amoksisilin trihidrat 500mg.

Koristi se u terapiji bakterijskih oboljenja svinja, brojlera, čurki i pataka. Lek se primenjuje p. o. kod svinja u dozi od 20 mg po kg t.m. dnevno u toku 4 dana, brojlera 15mg po kg t.m. dnevno u toku 5 dana,

čurki 15-20mg po kg t.m. dnevno u toku 5 dana i pataka 20mg po kg t.m. dnevno u toku 3 dana.

Karenca: Meso: Brojleri 1 dan; Patke 7 dana; Čurke 5 dana; Svinje 6 dana. Lek se ne koristi kod živine (nosilja) konzumnih jaja

Pakovanje: 1 kg

KETOPROCEN.

cenavisa



Sastav: 1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca: Ketoprofen 100,0 mg

Antiinflamatorni, analgetički i antipiretički tretman stanja i oboljenja kod

ciljnih vrsta životinja: konji, goveda i svinje

Pakovanje: 100ml

Tilocen-20

cenavisa



Sastav:

Rastvor za injekciju, 100ml, Tilozin (u obliku tartarata) 200mg/ml;

Za goveda i svinje; doziranje: 0,5-1ml/10kg t.m.

Karenca:

Goveda:

Meso 24 dana; mleko 108 časova;

Svinje:

Meso 13 dana

Pakovanje: 100ml



CENFLOX, oralni rastvor

cenavisa



Sastav:

Enrofloxacin (200 mg/ml)

Za piliće, ćurke i kuniće

Karenca: (Meso i iznutrice)

- pilići 7 dana
- ćurke 13 dana
- kunići 3 dana

Lek se ne primenjuje i kod koka nosilja konzumnih jaja. Mladim kokama, (koje služe za zamenu starih koka nosilja po završetku eksploatacije) lek se može davati do 14 dana pre pronosnja

Pakovanje: 1 litar

CENDOX, prašak za oralni rastvor

cenavisa



Sastav:

Doksiciklin (500 mg/g)

Za telad, svinje i brojlere

Karenca: (meso)

- Brojleri 7 dana
- Tovne svinje 5 dana
- Telad pre početka preživljanja 7 dana

Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja. Ne koristiti u periodu od 4 nedelje pre pronosnja.

Pakovanje: 1 kg

HEMATICEN 200mg/ml bočica 100ml

cenavisa



Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži aktivnu supstancu:

Gvožđe III joni.....200 mg

Indikacije: preveniranje i lečenje anemije prouzrokovane nedostatkom gvožđa kod prasadi.

Karenca: meso i jestiva tkiva: 0 dana

CENFLOX 100 mg/ml

cenavisa



Rastvor za injekciju za goveda i svinje

Aktivna supstanca:

Enrofloxacin 100,0 mg

INDIKACIJE

Goveda - Lečenje infekcija respiratornog trakta koje izazivaju mikroorganizmi osetljivi na enrofloxacin, kao i mastitisa uzrokovanog bakterijom *E. coli*.
Svinje - Lečenje bronhopneumonije koje izazivaju bakterije osetljive na enrofloxacin

PRIMENA:

- Goveda: subkutano (respiratorna oboljenja) ili intravenski (kolimastitis)
- Svinje: intramuskularno jednokratno

KARENCA

Goveda: Meso: 14 dana (subkutano), 7 dana (intravenski); mleko: 120 časova (5 dana), (subkutano), 72 časa (3 dana), (intravenski); *Svinje:* Meso: 12 dana (intramuskularno)

Anti-mite


ALPHATECH



Dodatak ishrani za živinu
(protiv crvene grinje)

Uputstvo za upotrebu:

0,5 lit. Proizvoda rastvoriti u 1000 lit.vode za piće tokom 4 dana , uzastopno. Početi sa davanjem kod mladog jata , odmah po useljenju u objekat.

Nastaviti sa istom dozom po 2 dana uzastopno, svakog meseca, tokom celog perioda eksploatacije jata.

Pogodan za organsku, farmsku proizvodnju.

Proizvođač: ALPHATECH – Zi du Grand Plessis, 22940 Plainetel, Francuska

Pakovanje: 5 l

Vitaminsko-mineralni preparati sa dodatkom biljnih ulja

Suplexan Karni

(Beta-karoten, L- karnitin)

za sve životinje

Pakovanje: 5 lit.



 **INTERMAG**

Suplementi za pse i mačke





KNZ mineralni blokovi

KNZ su mineralni blokovi (lizalice) veoma pogodni za dopunu i balansiranje ishrane domaćih životinja. Kroz različite uravnotežene formulacije makro i mikroelemenata, vitamina i specijalnih dodataka pružamo efikasna rešenja za sve faze proizvodnje.

Tradicija proizvodnje mineralnih blokova duga preko 100 godina je započeta u Holandiji i tokom niza godina je usavršavana različitim inovacijama i proširivanjem ponude sa akcentom zadovoljavanja potreba različitih vrsta životinja.

KNZ proizvodi:

- ✓ **TRADITION UNIVERSAL** – univerzalni sastav pogodan za sve životinje i njihove dnevne potrebe
- ✓ **KNZ JUNIOR** – pogodan kako za mlađe kategorije, tako i za odrasle životinje (sadrži vitamin AD3E) – bolji rast, imunitet i reprodukcija
- ✓ **TRADITION FERTILITY** – povećava fertilnost i pomaže reprodukciju (naglašen vitamin E i selen u 2 oblika – organski i neorganski)
- ✓ **KNZ SHEEP** – za ovce, bez prisustva bakra (za zdravu štitnu žlezdu, dobru digestiju i jake kosti) sa naglašenim selenom za bolju reprodukciju i vitalniju jagnjad
- ✓ **TRADITION UNIVERSAL WILD** – za divlje životinje, nadoknada mikroelemenata za životinje koje nastanjuju nacionalne parkove, lovišta i zoo vrtove.
- ✓ **KNZ BIOTIN** – sadrži Biotin, koristi se za prevenciju bolesti papaka (za jače papke i bolje zdravlje životinja)
- ✓ **KNZ ELEMENTS PLUS** – naglašeni mikroelementi za životinje sa većim potrebama u uslovima slabije ishrane ili ispaše sa naglašenim cinkom i bakrom (bolje zdravlje vimena i papka)

Davati po volji, blok postaviti blizu adekvatnog napajališta.

Blok nije vodotopiv, rastapa se isključivo pod dejstvom pljuvačke životinja.

Svi blokovi su sertifikovani za organsku proizvodnju.

		UNIVERSAL	STANDARD sa više selena	ELEMENTS PLUS na ispaši	FERTILITY	BIOTIN za zdrave kandže	JUNIOR za mladu stoku	SHEEP	WILD
SO (NaCl)	%	> 99	> 99	> 97	> 99	> 98	> 90	> 98	> 98
NATRIJUM	%	39,0	39,0	28,2	39,1	38,8	35,1	38,8	38,8
MAGNEZIJUM	%	0,2	0,2	0,2	–	0,1	5,0	0,2	0,2
CINK	mg/kg	810	810	10.000	–	500	4.000	5000	800
BAKAR	mg/kg	220	220	1.500	–	150	2.500	–	2500
JOD	mg/kg	100	100	100	300	100	100	300	50
SELEN	mg/kg	10	20	10	23	20	10	10	25
SELENSKI KVAS	mg/kg	–	–	–	2	–	–	–	–
GVOŽĐE	mg/kg	–	–	–	–	–	500	500	700
VITAMIN A	IJ	–	–	–	–	–	225.750	–	–
VITAMIN D3	IJ	–	–	–	–	–	51.150	–	–
VITAMIN E	IJ	–	–	–	1.000	–	380	–	–
VITAMIN H/ BIOTIN	mg/kg	–	–	–	–	150	–	–	–
SERTIFIKOVANO ZA ORGANSKI UZGOJ		✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓

Mreže za baliranje

Tehničke karakteristike proizvoda

- Širina mreže : 123 cm
- Dužina rolne: 2000 m ; 2500 m ; 3000 m
- Težina materijala: cca 12,5 gr/m²
- Dimenzija hilzne: 76 mm
- Prekidna čvrstoća materijala: 250 kg/ 50 cm
- Težina rolne: 24 kg
- Materijal izrade: HDPE – UV stabilan



Folija za baliranje

Tehničke karakteristike proizvoda

- Širina mreže: 750 mm
- Dužina rolne: 1500 m
- Debljina: 25 mikrona
- Boja: bela







Navodnjavanje i folije



agrimatco

Navodnjavanje

Sistemi za navodnjavanje kap po
kap
Creva za navodnjavanje

Folije

za plastenike
za baliranje
za proizvodnju povrća
za proizvodnju jagoda

Mreže

za zasenu
za baliranje
rašel vreće

Agrotekstil

PRIRODA JE DEO NAŠEG ŽIVOTA. NJENE PLODOVE TREBA UZGAJATI PAMETNO I PAŽLJIVO.



Kao jedan od svetskih lidera u proizvodnji cevnih sistema nudimo Vam kompletna rešenja i uslugu za sisteme navodnjavanja:

- Savetovanje i pomoć pri izboru sistema za navodnjavanje koji odgovara Vašim potrebama
- Projektovanje sistema za navodnjavanje
- Kompletan asortiman opreme za navodnjavanje (fertiligacione i filterske stanice, smart sistemi za navodnjavanje, rasprskivači, kapljači,...)
- Dostava opreme na mesto izvođenja
- Ugradnja sistema za navodnjavanje
- Savetovanje pri upotrebi i održavanju sistema za navodnjavanje
- Garancija na kompletan asortiman ugrađene opreme
- Zalihi rezervnih delova

Svoj svetski uspeh gradimo na osnovu ulaganja u znanje, inovacije i visok kvalitet naših proizvoda. Najvažnija karika u našem uspehu je što smo naučili da osluškujemo potrebe kupaca. Smešteni u 27 zemalja širom Evrope, osiguravamo bezbedan, zdrav i bezbrižan život za sadašnje i buduće generacije.

Pipelife Serbia je deo evropskog koncerna Pipelife International GmbH i deo Wienerberger grupe, jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevi i fittinga, šahtova i opreme za navodnjavanje.

Otkrijte širok spektar naših proizvoda i usluga online.

www.pipelife.rs

PIPELIFE 
always part of your life

GEROVIT rašel vreće

Pojedinačne vreće sa vrpcom

Dimenzije	Nosivost
30 × 40	5 kg
35 × 50	10 kg
40 × 60	15 kg
43 × 63	20 kg
45 × 75	25 kg
50 × 80	30kg



Dostupne boje:



Lay flat crevo za navodnjavanje

Naziv artikla	pakovanje
LAY FLAT CREVO 2" (SKY) 53 mm (6bara/100met)	100m
LAY FLAT CREVO 3" (SKY) 78 mm (4bara/100met)	100m
LAY FLAT CREVO 4" (SKY) 105 mm (4bara/100met)	100m



Folije za proizvodnju povrća

dimenzija × pakovanje × debljina
0,8m × 500m × 15 mic
0,8m × 1000m × 15 mic
1,0m × 500m × 15 mic
1,0m × 1000m × 15 mic
1,0m × 3500m × 15 mic
1,2m × 500m × 15 mic
1,2m × 1000m × 15 mic

Folije za proizvodnju jagode

dimenzija × pakovanje × debljina
1,0m × 500m × 30mic
jedan red rupa na 20 cm Ø6cm
1,0m × 1000m × 30mic
jedan red rupa na 20 cm Ø6cm
1,2m × 500m × 30mic
dva reda rupa 30×35 Ø6cm
1,2m × 1000m × 30mic
dva reda rupa 30×35 Ø6cm

Agrotekstil



GLAVNE OSOBINE AGROTEKSTILA

- Štiti useve od mraza i velikih temperaturnih razlika
- Povećava broj ciklusa u poljoprivrednoj proizvodnji u toku godine
- Visoka propusnost za svetlost
- Lagan i ujednačen materijal
- Pruža zaštitu od insekata i životinja
- Ekološki materijal pogodan za recikliranje
- Otporan na spoljne temperature od -40°C do +80°C

dimenzija × pakovanje × težina
4,25 m × 100 m 17 gr/m ²
4,25 m × 100 m 19 gr/m ² RNF
4,25 m × 250 m 17 gr/m ²
6,40 m × 100 m 17 gr/m ²
6,40 m × 100 m 19 gr/m ² RNF
6,40 m × 250 m 17 gr/m ²
8,00 m × 100 m 17 gr/m ²
8,00 m × 100 m 19 gr/m ² RNF
8,00 m × 250 m 17 gr/m ²
10,50 m × 100 m 19 gr/m ² RNF
10,50 m × 250 m 19 gr/m ² RNF
12,00 m × 100 m 19 gr/m ² RNF
16,00 m × 100 m 19 gr/m ² RNF

Sistemi za navodnjavanje kap po kap za profesionalne proizvođače

GEROVIT®

Maksimalna dužina reda (m)

kapljač	efikasnost	rastojanje između kapljača		
		10 cm	20 cm	30 cm
l/h	%			
1,0	85	100	156	200
1,5	90	85	124	154

PIPELIFE 
always part of your life

Maksimalna dužina reda (m)

protok po kapljaču	uniformnost kapljanja	rastojanje između kapljača			
		10 cm	15 cm	20 cm	30 cm
l/h	%				
0,6	90	140	180	210	268
	85	170	220	260	335
1,0	90	100	125	150	190
	85	125	160	185	235



Maksimalna dužina reda (m)

protok po kapljaču	uniformnost kapljanja	rastojanje između kapljača			
		10 cm	15 cm	20 cm	30 cm
l/h	%				
0,6	90	140	180	210	268
	85	170	220	260	335
1,0	90	100	125	150	190
	85	125	160	185	235

Rast biljaka je povezan sa potrebom za određenom količinom vode u određeno vreme i obezbeđivanjem potrebne vode tokom cele sezone.

Trake iz prodajnog asortimana Agrimatco doo su napravljene da zadovolje potrebu biljaka za navodnjavanjem u intenzivnoj proizvodnji. Jednostavnost u korišćenju, pouzdanost u radu, kvalitet i cena izdvajaju naše trake u odnosu na ostale. Trake kupljene kod nas možete koristiti u različitim povrtnarskim usevima, u voćarstvu, na otvorenom polju ili u plastenicima.

Za povrtnare:

- **Trake kap po kap** - kvalitetni materijali, kao i precizna izrada traka, obezbeđuju veliku otpornost pa kidanje i istezanje.
- jednostavne za korišćenje, rade pa pritiscima od 0,5 do 1 bara

- trake su debljine 150 i 200 mic a razmak između kapljača je 10, 20 i 30 cm

Trake za navodnjavanje sa umetnutim kapljačem su predviđene za korišćenje kada se u vodi nalaze primese gvožđa, karbonata ili fine nečistoće koje filter ne može da zaustavi. Kostrukcija kapljača i njegov položaj pa traci otežavaju ulazak nečistoće u kapaljku te maksimalno produžavaju vek korišćenja trake u sezoni navodnjavanja. Dve linije na vrhu trake omogućuju lakšu orijentaciju i postavljanje trake.

- rade pa pritiscima od 0,5 do 1,0 bara
- trake su debljine 150 mic a razmak između kapljača je 20 i 30cm



Semena povrtnarskih useva



agrimatco



HOLLAR SEEDS

ESASEM



DÆHNFELDT
by Syngenta





Bellafore – zimska puterica



Najnovija zimska salata puterica pogodna za proizvodnju od jeseni do proleća, u plastenicima.

Glavice svetlo zelene boje težine 400–500g visoko tolerantna na stresne uslove proizvodnje. Veoma brza u proizvodnji i dugo zadržava svežinu nakon berbe. Visoka otpornost na niske temperature i plamenjaču salate Bl:16–37EU

Granola – batavia tip



Otvorena Batavia svetlo-zelene boje namenjena za setvu od kasne jeseni do ranog proleća. Brzo dostiže komercijalnu težinu, izuzetna po svojoj fleksibilnosti i izdržljivosti. Rastresita glavica ima veliki broj malih zbijenih listova što joj daje atraktivan izgled. Listovi su sočni i hrskavi slatkastog ukusa. Visoka otpornost Bl:16–35 (*Bremia lactucae*)

Radian – letnja puterica



Rana sorta vrlo brzog porasta i kratke vegetacije. Dobro podnosi visoke temperature i tolerantna je na procvetavanje. Formira kompaktne i ujednačene glavice. Listovi su sjajni, čvrsti, svetlo zelene boje. Dugo čuva svežinu u polju.

Visoka otpornost (HR): Bl: 16–37EU, Nr: 0, TBSV

Srednja otpornost (IR): LMV: 1

Totem F1



Visoko prinosna sorta, period sazrevanja 60 dana. Visina biljke 55 cm. Snažna rozeta sa uspravnim tamnozelenim listovima. dugog vrata. Vrlo ujednačen i tolerantan na vršnu palež. Može dugo stajati na polju uz zadržavanje kvaliteta. Lako se čisti.

Crunchy King F1



Srednje rani hibrid, savršeno okruglog oblika. Atraktivna, sjajno crvene boje, ujednačenih plodova. Može se proizvoditi tokom cele godine, ali je posebno pogodna za proletnu i jesenju proizvodnju.

Hipo F1



Hippo F1 jedan od najboljih SAKATINIH hibrida za letnju proizvodnju velike otpornosti na visoke temperature i tolerantnosti na trips, vegetacije oko 80 dana. Glavica je veoma atraktivnog izgleda, lepe boje i oblika i mogućnosti dugog stajanja na polju bez opasnosti od pucanja. Težina oko 2 – 3 kg. Odličnog ukusa i lepe unutrašnje strukture. Veoma lak za proizvodnju, visokog potencijala za prinose i veoma lak za prodaju.

Marloo F1



Kupus koji spada u grupu kupusa namenjenih za svežu potrošnju i kišljenje. Veoma sličan vodećem kupusu za kišljenje (Tanacity). Dužina vegetacije 90 - 100 dana, sa težinom glavice oko 3 kg. Oblik glavice malo okruglastiji od Tanacity-ja. Dobra otpornost na kolebanja toplo hladnih uslova. Visoka otpornost na *Xantomonas* i *Fusarium*.

Powerslam F1



Novi hibrid za letnju i jesenju proizvodnju, vegetacije 85 dana. Glavica okruglog oblika težine oko 2.5 do 3 kg pogodan za kišljenje i svežu potrošnju. Srednje zelene boje slatkog ukusa i lepe unutrašnje strukture. Dobro podnosi visoke temperature i bolesti.

Otpornosti HR: Foc:1/ IR: Xcc

Concept F1 CMS



Srednje rani karfiol vegetacije oko 85 dana. Odličan za letnju (berba već od polovine avgusta) i rano jesenju proizvodnju. Daje odlične rezultate i u lošijim uslovima proizvodnje, sa priličnom tolerantnošću na sušne i toplije uslove. Dobar za svežu potrošnju i za industriju. Odličnog samopokrivanja sa belim i zbijenim cvastima.

Marmorex F1



Hibrid karfiola koji takođe pripada novoj generaciji karfiola u Curdivex tipu. Sa vegetacijom od 70 do 75 dana veoma uspešno može da se proizvodi u toplijem periodu godine, a da pri tome daje odlične rezultate. Ono što ga čini posebnim je da zadržava belu boju i ne prelazi u krem boju čak i posle izlaganja sunčevoj svetlosti. Marmorex nudi ujednačeno sazrevanje što je veoma cenjeno kod proizvođača. Prosečna težina glavice preko 1.5 kg.

NOVO

SV1714VC



Noviji rani spanać iz Seminisove ponude. Veoma fleksibilan, prilagodljiv različitim uslovima i tehnologijama proizvodnje. Dobar je za klasičnu proizvodnju i za baby leaf proizvodnju. Brzog je porasta, veoma produktivan, zahvaljujući debljini listova i potencijalu prinosa. Najbolje rezultate daje u jesenjoj – zimskoj setvi. Obrazuje listove glatke površine, sa okruglim oblikom liske. Veoma dobar balans između dužine peteljki i listova. Rast erektivan, uspravni listovi. Tamno-zelena boja lista, veoma dobra sposobnost držanja na polju i odlična uniformnost. Odličan paket otpornosti na plamenjaču.

Otpornost: HR: Pfs 1-13.

Big Beef F1



Big Beef F1 je veoma popularan, indeterminatni, srednje rani, beef tip hibrida paradajza namenjen za proizvodnju u plastenicima i otvorenom polju tokom cele proizvodne sezone. Dolazi na branje oko 73 dana od rasadijanja. Biljke srednje bujnosti, kratkih internodija, prozračnog habitusa, lake za rad i proizvodnju. Plodovi dobre ujednačenosti, ovalno-okruglog oblika, krupnoće 280 – 300g, svetlo crvene boje, odličnog ukusa, dobre otpornosti na pucanje.

Otpornost: HR: ToMV:0-2/Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0; IR: Ma/Mi/Mj

Hayet F1



Rani hibrid indeterminantnog porasta. Biljka srednje bujna, veoma zbijena sa kratkim internodijama. Plodovi ujednačeni, krupnoće oko 240 g. Plodovi odlične crvene boje, veoma čvrsti, što mu daje dobru otpornost na transport i skladištenje. Namenjen za gajenje u plasteniku.

Otpornosti: HR / IR: ToMV: 0,1,2 / Vd: 0 / Fol: 0,1 / Pf: A-E / Mi / TSWV.

Matissimo F1



Indeterminantni hibrid paradajza, povećane otpornosti na TSWV, nematode i Cladosporium, prilagodljiv za različite uslove proizvodnje. Formira izuzetno ujednačene plodove, težine 230-250 g. Formira sjajne plodove intenzivno crvene boje u kontinuitetu, pravilnog, blago spljoštenog oblika, bez većih deformacija. Biljka srednje bujnosti, brzog porasta i ranostasnosti.

Otpornost: HR: ToMV:0-2/ToTV/Pf:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0;

IR: TSWV:0/Ma/Mi/Mj

Florida F1



Determinantni hibrid paradajza, dužine vegetacije od oko 90 dana od rasadijanja. Formira ujednačene krupne, izuzetno čvrste plodove, glatke pokožice, blago spljoštenog oblika. Biljka je bujnog habitusa, snažnog porasta, koja formira krupne listove koji dobro pokrivaju plodove. Dobro prilagodljiv tip paradajza namenjen za rast i proizvodnju u više različitih uslova proizvodnje i tehnologija gajenja.

Otpornost: HR: Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0;

Miko F1

NOVO



Novi paradajz iz semenske kuće Sakata

Srednje rani hibrid visokog potencijala rodnosti. Plodovi pravilnog oblika, ujednačeni, atraktivno crvene boje, težine oko 250g. Odličan ukus i čvrstoća ploda sa mogućnošću dužeg stajanja. Biljka kompaktna, kratak razmak između internodija omogućava kontinuiranu berbu.

Visoka otpornost: ToMV:0,1,2Vd:0/Fol:0,1

Srednja otpornost: TSWV/Mi

SV 4097CV F1

NOVO



Hibrid iz najnovije generacije partenokarpnog tipa kornišona sa sitnim bradavicama, pogodan za proizvodnju u različitim zemljišnim i klimatskim uslovima. Posедуje visok potencijal ranog i ukupnog prinosa. Plodovi odličnog tržišnog kvaliteta i tamnozelenе boje tokom cele berbe. Biljka je otvorenog habitusa sa ograničenim rastom bočnih izdanaka i kratkim internodijama. Dobro podnosi visoke temperature, kao i stresove u proizvodnji. Odlični rezultati pri rastu u uslovima veće količine svetlosti. Pogodan za gajenje na špaliru i na zemlji. Plodovi su ravni, cilindrični, tamnozelenе boje, bez gorčine. Odnos dužine i širine 3,5:1cm.

Otpornost: HR CMV/Ccu; IR Px;

Scilly F1



Najdominantniji hibrid tikvice nekoliko sezona unazad. Hibrid je u es-cenderani tipu, poseduje vrlo visok potencijal prinosa, sa vrlo kvalitetnim plodovima, cilindričnog oblika. Biljka je dobrog habitusa, dobro pokriva plodove, poseduje dugačak proizvodni potencijal, visoku stabilnost plodonošenja, naročito tokom letnjeg perioda, zbog dobre tolerancije na bolesti.

Cordelia F1



Hibrid nove generacije, namenjen za proizvodnju na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru tokom proleća, leta i jeseni. Spada u grupu visoko tolerantnih hibrida na pepelnicu i multivirus, izuzetno tolerantna na temperaturna kolebanja. Ranostasna i vrlo produktivna, jarko svetlo zelene boje.

Otpornost: IR = Gc / Px / CMV

Aziad F1



Extra rani hibrid sa visokim procentom svetlo zelenih plodova prve klase. Oblik ploda cilindričan do blago okrugao. Nakon berbe poseduje mogućnost dugog stajanja pri čemu zadržava visok kvalitet i čvrstoću plodova. Pogodna za gajenje u proleće, leto i jesen.

Otpornosti: ZYMV – WMV

Messenger



Messenger je dokazani, visokokvalitetan superslatki tip šećerca, dužine vegetacije 85-87 dana nakon nicanja. Biljka je veoma snažna, robusna, dobro stoji u različitim proizvodnim uslovima. Ima jaku stabiljiku, ne poleže lako. Messenger ima visok potencijal prinosa. Klipovi su ujednačene veličine, sa prosečno 18-20 redova. Prečnik klipa je 52-54 mm. Dužina klipa je 21-23 cm. Klipovi su atraktivno žute boje, a vrhovi klipova su ispunjeni zrnima. Klip je dobro pokriven listovima, koji do kraja pokrivaju vrhove. Veoma dobrog ukusa.

Veoma dobar paket otpornosti: HR: RpG59; IR: MDMV/SCMV/Et.

Silverado F1



Vrlo rani hibrid, sa izvanrednim potencijalom za prinos. Daje svetlo žute mesnate plodove, zadržavajući njegovu veličinu i kvalitet do samog kraja proizvodnje. Težina ploda od 180 do 210g. Internodije su kratke, jaka stabiljika mu omogućuje da dobro i ravnomerno rodi i u ekstremnim vremenskim uslovima. Preporučuje se proizvodnja na dve grane za plastenike kao i proizvodnja na otvorenom polju.

Sigurna proizvodnja u objektima zaraženim virusima.

Visoka otpornost: Tm: 0-3, TSWV i virus mozaika krastavca (CMV).

Goldano F1



Ekstra-rani hibrid u tipu bele babure. Izuzetno visok prinos u prvim berbama. Debljina mesa 7-9 mm, sjajno beli plodovi sa pretežno 3-4 komore. Težina ploda 170-200 g. Nije sklon nedostatku kalcijuma. Srednje jake biljke s kratkim internodijama. Preporučuje se proizvodnja na dve grane za plastenike kao i proizvodnja na otvorenom polju.

Visoka otpornost: Tm: 0-3, TSWV i virus mozaika krastavca (CMV).

Baklava F1



Rani hibrid svetlozelene boje sa plodovima konusnog oblika. Plodovi težine 130-140g. Namenjen za ranu plastičnu proizvodnju. Ima kratke internodije i dobro plodonosi čak i u uslovima slabog osvetljenja. Zahvaljujući otpornosti Tm: 0-2 i TSWV, može se uspešno i sigurno gajiti u bilo kom periodu vegetacije. Takođe se preporučuje za proizvodnju na otvorenom, kao i za grejane i negrejane objekte.

Visoka otpornost: Tm: 0-2, srednja otpornost: TSWV

Bibic F1



Rani hibrid izduženih plodova težine 120-160 g, debelog mesa (sitniji ali teški plodovi vrlo pogodni za punjenje). Plodovi u fiziološkoj zrelosti prelaze u crvenu boju. Biljka srednjeg rasta. Čvrsto stablo i snažan koren.

Sklop: zaštićeni prostor 4 - 4,5 biljaka/m², na otvorenom 5 - 6 biljaka/m². Bibic u proizvodnji na otvorenom osigurava ujednačene plodove odličnog kvaliteta koji su pogodni za transport. Posebno ga rade proizvođači koji žele da budu prvi na tržištu.

Bobita F1



Izrazito krupni plodovi sa izuzetno debelim mesom. Plod je težine 140-180 g. U fiziološkoj zrelosti je narandžaste boje. Dobro podnosi nedostatak kalcijuma. Sklop: u zaštićenom prostoru 4-5 biljaka/m², na otvorenom polju 5-6 biljaka/m².

Bobita predstavlja jedan od najpravihnijih hibrida u tipu babura.

Sobri F1



Može se saditi od februara do sredine jula. Plodovi su klasičnog „bo-giiszloi” oblika sa debelim mesom. Blago ljut, delikatan ukus. Koreni su jaki, prinos je veći od otvorenog oprašivanja sorte. Pogodan za zagre-janu, negrejanu opremu, kao i za otvoreno polje.

Otpornosti: HR Tm2

Archivarius F1



Srednje rani hibrid u tipu kapie. Plod pljosnat, sa dve komore težine 180-220 g. Jak korenov sistem i jaka stabljika. Dobro menja boju iz ze-lene u crvenu bez mikro pukotina. Pogodna za plasteničku proizvod-nju kao i za otvoreno polje.

Otpornosti: HR Tm2, IR TSWV

Trinity F1



Novi hibrid bele paprike konusnog oblika sa odličnom mogućnošću dužeg stajanja. Plodovi težine oko 150 g sa debelim zidovima. Nije osetljiva na nedostatak kalcijuma, formira veliki broja plodova sa sta-bilnim prinosom. Pogodna za proizvodnju u zatvorenom prostoru i na otvorenom polju.

Otpornosti: Tm: 0-2, TSWV, CMV

Nitro F1



Ljuta paprika, žućkasto bele boje ploda i sa izuzetnim potencijalom prinosa. To je ekstra rana sorta koja može dati mnogo i ujednačenih plodova, čak i pri slabom osvetljenju. Ima stalnu ljutinu i odličnu izdr-žljivost. Preporučujemo da se uzgaja na dva ili tri stabla ili u kordon-skom sistemu.

Težina: 60-80 g

Veličina: 3,5-4,5/18-26 cm

Otpor: HR: Tm:0-2, IR: TSWV, Ma/Mi/Mj



Fortesse F1



Fortesse F1 je vrlo pouzdan, dokazan, rani hibrid duge ljute paprike, svetlo zelene boje plodova i dosta lako se uzgaja. Namenjen je pre svega za ranu plasteničku proizvodnju u plastenicima sa i bez grejanja, jer dobro podnosi kratku dužinu dana tokom zimskih meseci. Biljka je srednjeg habitusa, više generativna, visokog potencijala rodnosti. Formira velik broj uniformnih plodova u kontinuitetu tokom sezone, visokog kvaliteta, dužine 22 – 25cm, prosečne težine 80 –100g. Otpornost: Tm2.



Atlas F1



Visok nivo šećera i odličan ukus. Izuzetan radman mesa u odnosu na semenu ložu. Plodovi su postojani kako na parceli, tako i u skladištu. Težina plodova od 2-3 kg. Vegetacija 80-90 dana.

Pluto F1



Slična ATLASU F1, samo su plodovi manji, težine oko 1-1,5 kg. Uniformni plodovi tolerantni na pucanje. Odličan kvalitet mesa, pogodna za preradu i za svežu upotrebu.

Crown Prince F1



Klasična zimska bundeva sa sivom bojom spoljašnjosti i narandžastim mesom. Veoma slatkog ukusa. Odlična sposobnost skladištenja i zimske prodaje. Težina od 3-4 kg.

Cordelia F1



PRAVI IZBOR ZA VISOK PRINOS, MEHANIZOVANO VAĐENJE I DUGO SKLADIŠTENJE

Srednje rani hibrid vegetacije 115 do 120 dana. Pogodan kako za sveže tržište tako i za industriju. Glavice uniformne okruglog oblika, krupne sa tankim vratom i dobre čvrstoće. Čvrste glavica, i veći broj ovojnih listova omogućava mehanizovano vađenje. U intenzivnoj tehnologiji proizvodnje daje visoke i stabilne prinose. Mogućnost izuzetno dugog skladištenja.

Reyana F1



Najnovija selekcija srenje ranog hibrida crnog luka vegetacije 110 do 115 dana. Hibrid formira krupne, čvrste, ujednačene glavice sa uskim vratom i veoma dobrom ljuskom, što omogućava mehanizovano vađenje. Reyana poseduje izuzetno visok potencijal rodnosti i dugo skladištenje.

Flavia F1



Jedna od najnovijih selekcija crnog luka intenzivno sjajne ljubičaste ljuske. Formira okrugle ujednačene glavice odlične čvrstoce i jake ljuske, što omogućava mehanizovano vađenje i dug lager u ovom segmentu.

Tucanon F1



Novi srednje rani hibrid, vegetacije 115 dana od nicanja. Ima veoma visoku otpornost na napade tripsa i bolesti. Poseduje visok potencijal prinosa, obrazuje okrugle, uniformne, krupne glavice. Glavice su vrlo ujednačene po obliku i veličini, sjajne bakarno braon boje, sa nekoliko ovojnih listova što omogućava mehanizovano vađenje. Namenjen je za svežu potrošnju, preradu, omogućava srednje dugo čuvanje do 7 meseci. Visok procenat monocentričnih glavica.

Pogodan je za naše uslove proizvodnje, jer dobro podnosi visoke temperature u proizvodnji. Lisna masa je dobro razvijena, uspravna.

Preporučena gustina setve je 0,9 – 1 milion sem./ha.

Almanzoro F1



Srednje rani hibrid crnog luka, dužine vegetacije 115 – 120 dana, nakon nicanja. Dobra tolerancija na napade tripsa i bolesti. Lukovice okruglog oblika, visoke uniformnosti, srednje krupnoće, lepe tamnije braon boje, sa nekoliko ovojnih ljuski. Vrlo visok potencijal prinosa i monocentričnih glavica. Dolazi na vreme za vađenje, ne produžava vegetaciju. Hibrid namenjen pre svega za svežu potrošnju, sa mogućnošću kraćeg lagera od 5 – 6 meseci. Preporučena gustina setve je 0,9 – 1 milion sem./ha.

Odyssey F1



Namenjena za ranu proizvodnju sa velikim plodovima težine 10-12 kg. sjajne i atraktivne kore. Plodovi blago ovalni sa tamnije zelenim prugama, crveno i hrskavo meso sa visokim sadržajem šećera. Bujna vreža dobro pokriva plodove bez opasnosti od ožegotina od sunca. Pogodna za kalemljenje.

Visoka otpornost na: Colletotrichum orbiculare (Anthracnose race 1)

Bryxberry F1

NOVO



Briksberi F1 je rani hibrid lubenice, sa standardnom crimson šarom tamnije boje. Biljka odlično pokriva listovima plodove i u težim vremenskim uslovima proizvodnje što daje sigurnost protiv ožegotina od sunca. Meso je tamno crvene boje, sa visokim sadržajem šećera, odličnog hrskavog ukusa. Plod je ovalnog oblika, veličine 8 - 9 kg, a 9 - 11 kg sa kalemljenjem. Preporučuje se za intenzivnu proizvodnju na otvorenom polju sa i bez mini tunela.

Otpornost: HR: Co:1; IR: Fon:1;

Romeria F1



Jedan od najkrupnijih hibrida crne lubenice. Biljke veoma jake sa vrežama koje odlično pokrivaju plodove koji ostaju crni i u najtoplijem periodu vegetacije. Srednje rani hibrid sa prosečnom težinom ploda 10-12 kg, dok na kalemu postiže i do 14 kg. Odlična tamna boja spoljašnjosti i tamno crvena unutrašnjost daju plodu izuzetno lep izgled. Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antraknozu*.

Candice F1



Hibrid okruglo ovalnog oblika, 8-11 kg, visokog kvaliteta, srednje ranostasnosti, atraktivne crvene boje i sitnih semenki. Izuzetno stabilan hibrid u proizvodnji, veoma dobre transportabilnosti.

Srednja otpornost na: Mb (*Mycosphaerella*)

Centro F1



Rani hibrid dinje u cantalopa tipu, jedna od najpouzdanijih dinja iz Seminisove ponude. Namenjena je prvenstveno za intenzivnu proizvodnju na otvorenom polju sa mini tunelima, a odlična je i bez tunela zbog kratkog vegetacionog ciklusa i generativnog habitusa. Odlikuje se dobrim zamatanjem plodova čak i u hladnim vremenskim uslovima proizvodnje. Pogodna je i za plasteničku proizvodnju. Potencijal prinosa je vrlo visok i može se još dodatno povećati podlogom za kalemljenje zahvaljujući generativnim svojstvima hibrida. Spoljašnjost ploda je sa izraženim kriškama, a veličina ploda je od 1,5-1,7 kg, unutrašnjost mesa je narandžaste boje, vrlo aromatičnog ukusa. Otpornost: HR: Fom:0,1,2; IR: Gc/Px:1,2,5;

Exelor F1



Exelor F1 je dinja koja tokom cele sezone daje plodove prve klase, ekstra ranog dozrevanja, što joj omogućava da se rano pojavi na tržištu. Visoka tolerancija na pepelnicu omogućava dug i kvalitetan rod tokom cele vegetacije. Plodovi krupnoće 1,5-1,8 kg, sa visokim sadržajem šećera. Odličan hibrid za ranu proizvodnju.

Otpornosti: MNSV / Fom: 0-2 / Gc: 1 / Px: 1,2,5



- **GT Pr - 30/70** w/b, 0-5 mm, đubrivo 1 kg/m³, okvašivač 1 l/m³, pH 5,5-6,5 (70 lit)
- **GT 0 F/M/C -**
 - 100% beli, 0-5 mm, pH 4-4,5 - FINE (250 lit)
 - 100% beli, 0-10 mm, pH 4-4,5 - MEDIUM (250 lit)
 - 100% beli, 0-40 mm, pH 4-4,5 - COARSE (250 lit)
- **GT 2 - 70/30** w/b, 0-5 mm, đubrivo 1 kg/m³, okvašivač 1 l/m³, pH 5,5-6,5 (250 lit)
- **GT 3 - 70/30** w/b, 0-20 mm, đubrivo 1 kg/m³, okvašivač 1 l/m³, pH 5,5-6,5
+ Osmocote Exact 5-6 1 kg/m³, ME 0,2 kg/m³,
glina 10 kg/m³ (250 lit)





Mineralna đubriva



agrimatco



YaraMila Complex 12:11:18 (MgO, S, B, Zn, Mn, Fe)



YaraMila Complex je izvoran proizvod iz Norveške i najefikasnije đubrivo na svim tipovima zemljišta: na zaslanjenim zemljištima, pri povišenim pH, te na zemljištima iscrpljenim višegodišnjim intenzivnim uzgojem.

Jedna od važnih karakteristika YaraMila Complexa, po kojoj se razlikuje od svih trenutno dostupnih đubri-va na tržištu, je sadržaj fosfora (P) koji je u obliku orto i polifosfata, te omogućava najvišu iskorišćenost i efikasnost fosfora u širokom rasponu pH zemljišta. Kalijum je 100% u obliku kalijum-sulfata.

Koristi se za voće, vinograde, povrće u plastenicima i na otvorenom.

Doza primene: 300-800 kg/ha

Pakovanje: 25/1

YaraMila ELIOS 13:11:21 (Mg,B) YaraMila Corn 8:20:28 (Mg, S)



Za zemljišta sa uravnoteženim odnosom hraniva, za jesenje i prolećno đubrenje ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljaka.

Jesenje đubrenje: zaoravanje i osnovno đubrenje 200-500 kg/ha.

Proleće: u pripremi zemljišta ako nije bilo jesenjeg đubrenja, 200-500 kg/ha.

Izvršno uravnotežena kombinacija hraniva za useve kukuruza, suncokreta, soje, uljane repice, šećerne repe, kao i za sve vrste povrtarskih i voćarskih kultura

Pakovanje: 25/1, 40/1, 1000/1



YaraMila NUTRIBOOST 16:27:7 (S, Zn)



Za žitarice i zemljišta sa srednjim i višim sadržajem kalijuma. Primenjuje se najviše u strnim žitima u jesen u količini 250 - 400 kg/ha, i u kukuruзу za jesenje ili prolećno đubrenje u količinama od 250-400 kg/ha.

Pakovanje: 25/1, 40/1, 1000/1



YaraTera Unika Plus 13:0:45



YaraTera Unika Plus je granulirani kalijum nitrat pogodan za primenu rasipačima i uređajima za setvu. Sadrži 13,6% azota u obliku nitrata i 45% kalijuma u obliku K₂O.

Primenjuje se u tehnologijama kada je potrebno dodati veće količine azota i kalijuma od standardnih preporuka. U voću, vinogradima i povrću uzgajanim na otvorenom primenjuje se nakon cvetanja, tokom intenzivnog razvoja plodova do zrenja u količini od 100 - 250 kg/ha. Izvršni rezultati dobijeni su primenom Unika Plus đubriiva u intenzivnim usevima koji se navodnjavaju sistemom kišenja. Prinos i kvalitet paprike, paradajza i kupusnjača prihranjivanih đubrivom Unika Plus znatno su viši nego plodovi tretirani standardnim đubrenjem. Takođe se uspešno može koristiti u prihrani šećerne repe za povećanje prinosa i sadržaja šećera u količinama od 100 - 150 kg/ha

Pakovanje : 25/1



YaraLiva Nitrabor 15,5 N + 25,5 CaO + 0,3 B



YaraLiva Nitrabor je granulirani kalcijum nitrat koja se primenjuje rasipanjem po površini ili se unosi u zemljište obradom. Nitrabor je topiv u vodi te se u proizvodnji granula koriste premazi kako bi otapanje u zemljištu trajalo duže i dalo maksimalnu iskoristivost đubriva. Veličina i ujednačenost granula osiguravaju ravnomeran raspored hraniva po celoj površini uzgoja. YaraLiva Nitrabor se koristi u količini 250-500 kg/ha. U povrtarstvu se unosi u pripremi zemljišta pred setvu ili sadnju i u prihrani tokom vegetacije. U voćarstvu i vinogradarstvu primenjuje se nakon početka vegetacije do kraja cvetanja.

Količina primene: 250 – 500 kg/ha

Pakovanje: 25/1

YaraBela Sufan 24 N + 15 SO₂ YaraBela Extran 26



YaraBela su đubriva vrhunskog kvaliteta na bazi azota. Proizvodi YaraBela na bazi nitratnog i amonijačnog azota garantuju uravnoteženo snabdevanje azotom, univerzalni su i lako se primenjuju na mnogim usevima. Proizvodi YaraBela posebno su osmišljeni kako bi biljka prihvatila azot u što kraćem vremenu. YaraBela proizvodi prate visoke Yara standarde, pretvarajući amonijačni azot u nitratni, a u nekim slučajevima sadrže dodatna hraniva kao što su kalcijum i sumpor.

YaraBela đubriva koriste se u prihrani svih useva u količinama 150-600 kg/ha.

Pakovanje: 25/1 i 750/1



YaraMila NP Starter 10,5 N + 47 P



Upotrebom mikrogranuliranih đubriva, uz istu količinu primene đubriva dobijamo bolju raspodelu u zemljištu. Pored azota i fosfora YaraMila NP Starter sadrži dodatne mikroelemente (Zn 1,8%, B 0,1%).

Osnovni cilj primene mikrogranuliranih đubriva je preciznije doziranje đubriva radi boljeg iskoriscenja hraniva od strane biljaka.

Primenjuje se u količini 15-20 kg/ha.

Veličina granule YaraMila NP Startera je 0,5-1,4mm.

Pakovanje: 10/1

YaraLiva Calcinit 15,5 N + 26,3 CaO



YaraLiva Calcinit je najkvalitetnija formula kalcijum nitrata, potpuno topiva u vodi, za upotrebu u fertigaciji i hidroponiji, a ne postoji rizik od začepjenja sistema za navodnjavanje.

Primenjuje se u količini 150-500 kg/ha, koncentraciji 0,5-2 g/l vode te pravilno raspoređeno tokom vegetacije, zavisno od potreba i razvojne faze useva. Pruža neposrednu i sigurnu snabdevanost biljaka azotom i kalcijumom, posebno u uslovima niskog i visokog pH.

Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista K Plus 13:0:47



YaraTera Krista K Plus je vodotopivi kalijum nitrat, izuzetne čistoće.

Prednosti:

- Izuzetno topiv
- Zbog niskog odnosa N-K, može se primenjivati u svim usevima i svim razvojnim fazama biljaka
- N je u obliku nitrata, ne gubi se isparavanjem i pomaže unos drugih katjona, kao Ca++, Mg++.

- Nizak EC
- NE SADRŽI Cl⁻, Na, ni teške metale.

Upotreba:

U fertigaciji pri uzgoju u zemljištu i u hidroponiji Podstiče važne fiziološke procese u biljci, npr. naličjevanje i zrenje plodova.

Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista SOP 52 K + 45 SO₃



YaraTera Krista SOP je vodotopivi kalijum sulfat.

Prednosti:

- Visoka topivost u vodi
- Visoka koncentracija kalijuma te odsustvo azota i fosfata osiguravaju pravu dozu kalijuma u svakoj fazi biljnog rasta
- Na alkalnim zemljištima kalijum sulfat malo snižava pH u zoni korena te tako poboljšava dostupnost fosfata i nekih mikroelemenata

- U sistemima za navodnjavanje kap po kap kalijum sulfat pomaže snižavanje Ph vode za navodnjavanje
- Ne sadrži Cl, Na, ni teške metale

Primena: Kod sistema navodnjavanja kap po kap na alkalnim zemljištima nizak Ph kalijum sulfata pridonosi laganom zakišeljavanju u zoni korena, te omogućava dostupnost fosfora i nekih mikroelemenata u zemljištu.

Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista MgS 16 MgO + 33 SO₃



YaraTera Krista MgS je vodotopivi magnezijum sulfat.

Prednosti:

- Potpuno vodotopiv
- Uravnotežen sadržaj hraniva čini Krista MgS najviše korišćenim izvorom magnezijuma u programima fertigacije
- Ne sadrži Cl, Na, ni teške metale

Primena:

U usevima koji se navodnjavaju je veoma čest nedostatak magnezijuma zbog kompeticije sa Ca, te posebno sa NH₄-N (amonijačnim oblikom azota). Proizvodom Krista MgS možemo dodati magnezijum, a da pritom nećemo dodati prefiše sulfata.

Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista MKP 0:52:34



YaraTera Krista MKP je vodotopivi monokalijum fosfat

Prednosti:

- Poboljšava obojenost, vreme skladištenja i čvrstoću plodova
- Izuzetno topiv (na 20°C 230 g/l vode)
- Nizak EC (0,7 mS/cm za svaki 1 g/l pri 25°C) omogućava upotrebu u visokim koncentracijama
- Održava odealan Ph (4,5) zbog puferskog delovanja fosfata na fertigacijski rastvor

- Ne sadrži Cl, Na, ni teške metale

Primena:

- U fertigaciji pri uzgoju u zemljištu i u hidroponiji
- Zbog malog rizika od oštećenja lista, kompatibilnosti s velikom većinom đubriva i pesticida i stabilnog pH, Krista MKP može se koristiti i u folijarnoj aplikaciji.

Pakovanje: 25/1

YaraTera Krista MAP 12:61:0



YaraTera Krista MAP je vodotopivi monoamonijum fosfat za primenu u voćarstvu i povrtarstvu. Primena putem sistema kap po kap ili hidroponije.

Pakovanje: 25/1

YaraVita Rexolin Q40 (Fe-EDDHA, 6% Fe, orto-orto 4%)



Namenjen za ishranu biljaka gvoždem pri različitim pH uslovima. Stabilan je pri pH vrednostima 3,5-10. Koristi se pri uzgoju preko zemljišta i u hidroponiji. Posebno je delotvoran ako se primenjuje preko zemljišta.

Doza primene: 5-20 kg/ha

Pakovanje: 5/1

YaraVita Mantrac Pro (500 g/l Mangan)



Proizvod za ishranu biljaka manganom. Preporučena upotreba: za krompir, strna žita, povrće, voće i druge useve osjetljive na nedostatak mangana.

Doza primene: 1 l/ha u fazi intenzivnog rasta, u višegodišnjim kulturama nakon berbe, a pre opadanja lišća.

Pakovanje: 1/1, 5/1 i 1000/1.

YaraVita Zintrac 700 (700 g/l Cink)



Proizvod za ishranu biljaka cinkom. Preporučena upotreba: za kukuruz, voće, vinova loza, povrće i useve osjetljive na manjak cinka-Zn.

Doza primene: 0,5-1 l/ha

Pakovanje: 1/1, 5/1 i 1000/1.

YaraVita Stopit (225 g/l Kalcijum)



Proizvod za ishranu bilja sa kalcijumom. Preporučena upotreba: na voću i povrću da se spreči nedostatak kalcijuma-Ca.

Doza primene: 3-5 l/ha.

Vreme primene: od početka vegetacije ili na kraju cvetanja do početka intenzivnog rasta plodova. Koristi se od 3 do 6 puta, zavisno od potreba useva za kalcijumom i od količine kalcijuma u zemljištu.

Pakovanje: 1/1, 5/1 i 1000/1.

YaraVita Zeatrel (43 P + 7,7 K + 14 Zn + 6,7 Mg)



Proizvod za folijarno tretiranje kukuruza. Doza primene: 3-5 l/ha.

Vreme primene: 1-2 tretmana u fazi 4-8 listova, s pesticidima ili bez njih.

Pakovanje: 5/1 i 1000/1

YaraVita Universal Bio 8,5:3,4:6 (B, Cu, Mn, Mo, Zn)



Složeno tečno đubrivo sa mikroelementima. Primenjuje se kod uljanih kultura, kukuruza, žitarica, voća, povrća, jagodičastog voća i cveća.

Primenjuje se folijarno u količini 2-5 l/ha.

Pakovanje: 5/1 i 1000/1

YaraVita Bortrac 150 (150 g/l Bor etanolamin)



Proizvod za folijarnu ishranu biljaka Borom. Koristi se u voću, povrću, vinovoj lozi, šećernoj repi, suncokretu, uljanoj repici i na drugim usevima osetljivim na manjak bora-B.

Doza primene: 1-2 l/ha u početku vegetacije do cvetanja, kod višegodišnjih zasada i posle berbe.

Pakovanje: 1/1, 5/1 i 1000/1

YaraVita Brassitrel Pro (5,2 N + 4,9 Ca + 8,7 MgO + 3,3 B + 4,6 Mn + 0,3 Mo)



Proizvod namenjen za folijarno tretiranje uljane repice, suncokreta, soje, kupusnjača.

Vreme primene: u jesen nakon nicanja uljane repice, a u proleće od početka vegetacije do pred cvetanje useva. Na suncokretu nakon nicanja do butonizacije. Na soji od faze prvog para pravih listova (jednostavni listovi) te tokom intenzivnog rasta i cvetanja. Na kupusnjačama od sadnje do kraja formiranja glavica ili cvasti.

Pakovanje: 5/1 i 10/1

YaraVita Gramitrel (6,1 N + 25 MgO + 5 Cu + 15 Mn + 8 Zn)



Proizvod je namenjen za folijarno tretiranje strnih žita: pšenica, ječam, tritikale zob i raž.

Vreme primene: u proleće do faze klasanja, zajedno sa tretmanom pesticidima.

Doza primene: 3-4 l/ha

Pakovanje: 5/1 i 1000/1

YaraVita Thiotrac (20 N + 30 SO₃)



Folijarni proizvod koji sadrži azot i sumpor čime dodajemo ova dva elementa nužna za poboljšanje kvaliteta prinosa strnih žita, kukuruza, uljane repice i na usevima osetljivim na manjak sumpora (S).

Doza primene: 3-5 l/ha

Pakovanje: 5/1 i 1000/1

YaraVita Last N 25:0:0



YaraVita Last N je koncentrovani proizvod koji sadrži azot u obliku tečne uree. Namenjen za folijarnu primenu. Pored toga što se izuzetno brzo usvaja putem lista, 25% od ukupnog azota je u sporo oslobađajućem obliku i tako obezbeđuje dužu ishranu biljaka ovim elementom. Zbog toga u mnogim slučajevima se smanjuje broj primene tokom vegetacije.

Primenjuje se u jabukama, strnim žitima, krompiru i soji.

Doza primene: 5-20 l/ha u zavisnosti od kulture u kojoj se primenjuje, utrošak vode od 100-500 l/ha

Pakovanje: 20/1

YaraVita KombiPhos (29,8 P + 5,1 K + Mg + Mn + Zn)



YaraVita KombiPhos je koncentrovano tečno đubrivo koje sadrži fosfor, kalijum i magnezijum kako bi pomogli biljkama u vreme intenzivnog porasta ili da lakše prebrode različite vremenske prilike. Đubrivo se primenjuje u početnim fazama razvoja biljaka, kao startno folijarno đubrivo.

Doza primene: 3-4 l/ha

Pakovanje: 5/1, 10/1 i 1000/1

YaraVita Caltrac 560 (23,3 Ca + B + Zn)



Visoko koncentrovana formulacija kalcijuma koja je u potpunosti bezbedna prilikom primene. Sprečava pojavu gorkih pega kod jabuke, trulež donjeg dela ploda paradajza i paprike, ivičnu nekrozu, sušenje lista salate, pucanje plodova trešnje, breskve, nektarine i šljive.

Caltrac 560 se brzo usvaja, ali ima i produženo vreme delovanja, tako da smanjuje broj tretmana tokom jedne sezone.

Radi boljeg usvajanja preporučuje se primena kada biljke formiraju značajniju lisnu masu.

Doza primene: 2-5 l/ha, utrošak vode minimalno 500 l/ha

Pakovanje: 5/1, 10/1 i 1000/1

YaraVita Biotrac



YaraVita Biotrac je tečni biostimulator za folijarnu primenu. Zasniva se na mešavini hranljivih sastojaka i bioaktivnih jedinjenja dobijenih iz alge *Ascophillum nodosum*.

Razvijen je da ublaži uticaj abiotičkih stresnih uslova (npr. hladnoće i suše) i pomogne biljci tokom perioda intenzivnog rasta kako bi podstakao cvetanje, zamećanje ploda i poboljšao kvalitet i količinu prinosa.

Doza primene: 2-3 l/ha

Pakovanje: 5/1 i 10/1



BIOPLEX biostimulator sa visokim sadržajem aminokiselina



Kompleksni biostimulator za folijarnu primenu i postizanje visokih i stabilnih prinosa. Može se primeniti u bilo kojoj fazi vegetativnog rasta, cvetanja i zretanja plodova. Odličan za jačanje biljnih funkcija u periodima veće metaboličke aktivnosti. Može se primenjivati zajedno sa svim pesticidima.

Preporučena doza 250-500 ml/ha

Pakovanje: 0,25 i 1/1

ROOTEX 7:47:6 biostimulator za razvoj korenovog sistema sa aminokiselinama



Kombinacija organskih ekstrakta fosfora, kalijuma i slobodnih L-amino kiselina. Podstiče i pospešuje ukorenjavanje. Intenzivira dalji rast korena. Koristi se kod tek presađenih, ili direktno zasejanih kultura sa ciljem da se ubrza primanje presađenog rasada.

Poboljšava formiranje korena.

Rootex se aplicira u zemljište kod jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka u zoni korena.

Primena u povrtarstvu 2-6 kg/ha

Primena u voćarstvu 3-8 kg/ha

Pakovanje: 30g i 1kg

TRAZEX kompleks mikroelemenata (6 Fe, 6 Zn, 6 Mn, 2 Cu, 2 B)



Sa dodatkom aminokiselina

Uravnotežen kompleks mikroelemenata za primenu folijarno ili sistemima kap po kap.

Sadrži visoku koncentraciju gvožđa, mangana, cinka, bora i bakra sa dodatkom organskih ekstrakata i aminokiselina. Sadrži 22% mikroelemenata. Koristi se da bi se izbegli mogući nedostaci mikroelemenata posebno tokom faze intenzivnog porasta.

Primenjuje se folijarno ili sistemima kap po kap u količini od 1-3 kg/ha.

Dozvoljeno je mešanje sa pesticidima.

Pakovanje: 20g i 1kg

Agro-K Amino humusna kiselina dobijena iz leonardita



Vodotopivo folijarno đubrivo s visokim sadržajem fosfora i kalijuma. Takođe, sadrži L-aminokiseline i prirodne organske ekstrakte koji pospešuju rast i produktivnost biljke. Ovakva kompleksna formula omogućuje biljci bržu proizvodnju proteina. Time se poboljšava usvajanje nutrienata što rezultira povećanjem prinosa. Idealan je za kulture koje u isto vrijeme daju i cvijet i plod (paradajz, paprika, krompir, voće itd.). Najbolje prinose postizemo tako da primjenjujemo Agro-K pre i tokom cvatnje kao i za vreme formiranja plodova. Agro-K je vodotopivo đubrivo namijenjeno za ujednačeno sazrevanje, kvalitetnu pigmentaciju i sadržaj suve materije u plodovima.

Pakovanje: 1kg

H-85 humusna kiselina dobijena iz leonardita



H-85 je humektant-prah koji sadrži 850 grama po kilogramu fulvinske i huminske kiseline (dobijene iz leonardita), koji se mogu primeniti u zemljištu, a čiji je cilj da se poveća reakcija na primenu neorganskog đubriva, koje se uglavnom koristi za fertirigaciju. Preporučujemo primenu sredstva H-85 kod zemljišta koja imaju nizak nivo sadržaja organske materije, problem sa strukturom, nisku raspoloživost hranjivih materija i/ili ograničenu mikrobiološku aktivnost.

Doza primene: povrće 8-12 kg/ha, žitarice 3-8 kg/ha, voće 6-10 kg/ha, ukrasno bilje 10-15 kg/ha.

Pakovanje: 5kg



BioMax Magnum je bioaktivator, formulisan tako da njegove komponente stimulišu proizvodnju biomase, u svim klimatskim uslovima ili abiotskom stresu, povećavajući apsorpciju N kroz aktivnost mikroorganizama za fiksiranja azota.

Vreme i mesto primene:

U vreme vegetativnog rasta, u slučaju visoke akumulacije biomase.

Sastav: Azot N = 22%, Sumpor SO_3 = 0,1%, Kalijum K_2O = 0,3%, Cink Zn = 0,1%

Pakovanje: 20 litara



BioMax Karpum je bioaktivator koji dodavanjem specifičnih elemenata i jedinjenja jača one fenološke faze u kojima biljka ima visoku potrošnju energije.

Vreme i mesto primene: Razvoj i rast korena, pre i na početku cvetanja, u fazi zamećanja plodova

Sastav: Azot N = 2%, Fosfor P_2O_5 = 15%, Kalijum K_2O = 3%, Cink Zn = 0,1%

Pakovanje: 20 litara



AMMONIUM sulphate (21 N + 24 S)

SIMONIS
FERTILIZERS B.V.



Vodotopivi amonijum sulfat za primenu u voćarstvu i povrtarstvu.
Primenjuje se u sistemima za kap po kap i u hidroponiji.

Pakovanje: 25/1 i 50/1

AgroGold 4:3:2 organsko đubrivo - peletirani živinski stajnjak

SIMONIS
FERTILIZERS B.V.



Prosečan sastav:

- Organska materija 65%
- Suva materija min. 90%
- Vлага max. 10%
- Azot (N) 4%
- Fosfor (P₂O₅) 3%
- Kalijum (K₂O) 2%

Prednosti:

- Pобољшanje strukture zemljišta

- Snabdevanje hranljivih materija
- Smanjenje erozije
- Podsticanje rasta zemljišnih mikroorganizama

Prosečan prečnik peleta je 5 mm.

Doza primene svake četvrte godine:

- povrtarstvo 1000 kg/ha
- ratarstvo 800 kg/ha

Pakovanje: 25/1

AGRO DOUBLE NPK 4-5-2

NOVO

SIMONIS
FERTILIZERS B.V.



- Organsko NPK đubrivo: NPK 4-5-2
- Proizvod je napravljen od digestata, stajnjaka i biljnog materijala
- 100% prirodno, bez hemikalija ili drugih aditiva
- Visok procenat stabilne organske materije
- Bez patogena i semena korova
- Nizak sadržaj hlora
- Dozvoljeno u organskoj proizvodnji

Pakovanje: 25/1 i 1000/1

GranuPotasse



GranuPotasse je granulirani kalijum sulfat, sadrži minimum 50% K₂O (42% K) i 43% SO₃ (18% sumpora).

GranuPotasse daje visok kvalitet proizvoda sa izuzetnim ukusom. Poboľšava prinos, veličinu i konzistentnost proizvoda. Poboľšava otpornost na bolesti, a takođe doprinosi poboľšanom izgledu plodova.

Pakovanje: 25/1

SoluPotasse



SoluPotasse je vodorastvorljivi kalijum sulfat. Sadrži kalijum i sumpor u korisnim i lako dostupnim oblicima. SoluPotasse sadrži 51,5% K₂O (42% kalijum) i 46% SO₄ (18% sumpora).

SoluPotasse ima sve neophodne karakteristike da bude idealno đubrivo za fertigaciju. To je čisto, visoko koncentrovano, u potpunosti rastvorljivo đubrivo koje je jednostavno za primenu.

Pakovanje: 25/1

Novalon



Novalon je đubrivo koje se brzo rastvara i potpuno rastvorljiv u vodi. On sadrži visoke i uravnotežene makro i mikro elemente kao što su B, Mo i helatiran Cu, Fe, Mn, Zn u idealnim proporcijama. Proizvod je slobodan od nerastvorljivih ili fitotoksičnih sastojaka. Koristi se za upotrebu u sistemima za navodnjavanje ili folijarno u svim razvojnim fazama.

Pakovanje: 1/1 i 25/1

NPK formulacije:

- 20:20:20+ME
- 19:6:20+2,0MgO+ME
- 10:10:40+ME,
- 0:5:35+4,5MgO+ME,
- 12:48:06+ME,
- 15:05:35+ME
- 30:10:10 + 2 MgO + ME

Kalex Cu



Kalex Cu je tečno đubrivo koje sadrži bakarni fosfit. Doprinosi poboljšanju zdravlja useva. U obliku fosfita, bakar ima veliku biološku aktivnost – pomaže u suzbijanju širokog spektra bolesti izazvanih gljivicama i bakterijama

Sastav:

Azot (N) 9,6%, fosfor (P_2O_5) 20,8%, bor (B) 0,13%, bakar (Cu) 4%, cink (Zn) 0,12%.

Količina primene:

- Voće i grožđe: 80-100 ml/100 l
- Povrće: 40-80 ml/100 l
- Strna žita: 1-2 l/ha

Vreme primene:

2-4 aplikacije na svakih 8-12 dana. Kod ratarskih kultura može da se kombinuje sa pesticidima.

Pakovanje: 1/1 i 5/1

KALEX (aktivator prirodnih mehanizama samoodbrane u biljkama)



Kalex je specijalno tečno đubrivo koje jača prirodni mehanizam za samoodbranu u biljkama, zbog visoke koncentracije fosfora i kalijuma iz kalijumfosfita.

Sastav:

Fosfor anhidrid (P_2O_5) rastvorljiv u vodi 30%

Kalijum oksid (K_2O) rastvorljiv u vodi 20%

Proizvod se može primeniti folijarno ili sistemima za navodnjavanje kap po kap.

Količine primene:

- folijarno prskanje: 2-3 l/ha (200-300 ml/100l)
- navodnjavanjem kap po kap: 8-12 l/ha

Pakovanje: 1/1 i 5/1

AGROFOL 390 (tečno đubrivo NPK 10:10:10 sa helatnim mikroelementima)



Agrofol 390 je specijalno izbalansirano NPK tečno đubrivo sa visokim sadržajem mikroelemenata proizveden za folijarnu upotrebu.

Sastav:

- Azot (N) 10%
- Fosfor (P_2O_5) 10%
- Kalijum (K_2O) 10%
- Bor (B) 0,08%

- Gvožđe (Fe) EDTA 0,08%
- Mangan (Mn) EDTA 0,06 %
- Molibden (Mo) 0,02%
- Cink (Zn) EDTA 0,06%

Proizvod se primenjuje folijarno. Količine primene su: 3-5 l/ha

Pakovanje: 1/1 i 5/1

AMINOTON (aktivator rasta zasnovan na aminokiselinama)



Za primenu preko zemljišta i lista

Aminoton je organsko tečno azotno đubrivo koje se sastoji od mešavine aminokiselina i peptida prirodnog porekla. Visok sadržaj azota i ugljenika u proteinima daju značajne nutritivne osobine Aminotonu.

Sastav:

- Organski azot (N) 7,4%
- Organska materija (O.M.) 48%

- Neposredno podstiče rast mikroorganizama u zemljištu
- Povećava biološku plodnost
- Veća dostupnost i stabilno oslobađanje hranljivih materija za useve
- Više harmoničan rast biljaka bez perioda stagnacije vegetativnog
- Veći razvoj korena
- Manja učestalost deficita mikro i mezo elemenata i, shodno tome, smanjenje bolesti biljaka

CAL 21



Tečno đubrivo za folijarnu upotrebu na bazi kalcijuma u obliku kalcijum-oksida sa dodatnim mikroelementima.

Sastav:

- Kalcijum (CaO) 15%
- Mangan (Mn) 0,5%
- Cink (Zn) 0,5%

Primenjuje se tokom vegetacije po potrebi i zahtevima biljaka za kalcijumom.

Koristi se u voćarstvu i povrtarstvu u 3-8 tretmana tokom vegetacije.

Količina primene 3 l/ha.

Pakovanje: 5/1 i 1/1

MOLBOR



MOLBOR je tečno đubrivo namenjeno za folijarno prskanje. Ima visok sadržaj bora i molibdena, prilagođen svakoj fazi razvoja biljaka. Đubrivo zadovoljava nutritivne potrebe biljaka za borom i molibdenom i garantuje visok prinos i dobar kvalitet useva. MOLBOR sprečava i leči simptome nedostatka molibdena i bora

Sastav:

- Molibden 1,7%
- Bor 4,4%

Pakovanje: 5/1 i 1/1

NUTRISTAR LINIJA

NOVO



Grupa vodotopivih proizvoda u različitim kombinacijama makroelemenata za zatvaranje celog ciklusa proizvodnje u povrću, voćarstvu i ratarstvu.

Formulacije:

- Nutristar 08-05-40 + 2Mgo + ME
- Nutristar 11-40-11 + ME
- Nutristar 20-20-20 + ME
- Nutristar 15-5-35 + ME

Pakovanje: 15/1



Preporuke za đubrenje

Đubrenje pšenice

Osnovno đubrenje i prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila 16:27:7	startno - pred setvu	250 - 400 kg/ha
YaraBela Nitromag 27 ili YaraBela Sulfan 24	azotna prihrana (prva i druga)	200 - 400 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Faza razvoja	Količina
Novalon 20:20:20 + Bioplex	bokorenje	4-5 kg/ha + 250-500 ml/ha
Novalon 20:20:20 + Bioplex	faza zastavičara	4-5 kg/ha + 250-500 ml/ha
YaraVita Gramitrel	bokorenje	3-5 l/ha
YaraVita Thiotrac	sa tretmanom protiv Fusariuma	3 l/ha

Đubrenje kukuruza

Osnovno đubrenje i prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila 16:27:7	osnovna obrada ili pred setvu	250 - 400 kg/ha
YaraBela Nitromag 27 ili YaraBela Sulfan 24	predsetveno ili sa kultiviranjem	200 - 400 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Faza razvoja	Količina
Novalon 20:20:20 + Bioplex	4-8 listova	3-5 kg/ha + 250-500 ml/ha
YaraVita Zeatrel	4-8 listova	3 l/ha
YaraVita Universal Bio	4-8 listova	3-5 l/ha
YaraVita Zintrac	4-8 listova	0,5 l/ha
Agrofol 360	4-8 listova	3-5 l/ha

Đubrenje šećerne repe

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Elios 13:11:2 ili YaraMila 8:20:28	osnovna obrada ili pred setvu	300 - 500 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Faza razvoja	Količina
Novalon 20:20:20 + Bioplex	4-8 listova	3-5 kg/ha + 250-500 ml/ha

Đubrivo/formulacija	Faza razvoja	Količina
YaraVita Bortrac + Novalon 0:5:35 + Trazex	od sklapanja redova do kraja vegetacije	1,5-3 l/ha + 3-5 kg/ha + 1-2 kg/ha
YaraVita Universal Bio	od sklapanja redova do kraja vegetacije	3-5 l/ha
YaraTera Unika Plus	pre kultiviranja	100 - 150 kg/ha

Đubrenje suncokreta

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Elios 13:11:2 ili YaraMila 8:20:28	osnovna obrada ili pred setvu	200 - 400 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Faza razvoja	Količina
YaraVita Bortrac + Novalon 20:20:20 + Bioplex	do butonizacije	1 l/ha + 5 kg/ha + 250-500 ml/ha
YaraVita Brassitrel pro	do butonizacije	3 l/ha

Đubrenje soje

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Elios 13:11:2 ili YaraMila 8:20:28	osnovna obrada ili pred setvu	200 - 300 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Faza razvoja	Količina
Novalon 0:5:35 + Bioplex	do početka cvetanja	5 kg/ha + 250-500 ml/ha
YaraVita Brassitrel pro	8-10 listova	3 l/ha
YaraVita Bortrac	8-10 listova	1 l/ha
Trazex + Bioplex	do početka cvetanja	0,5 kg/ha + 250 ml/ha

Đubrenje uljane repice

Osnovno đubrenje i prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Elios 13:11:2 ili YaraMila 8:20:28	osnovna obrada ili pred setvu	200 - 400 kg/ha
YaraBela Sulfan 24	u proleće, pre faze intenzivnog porasta	200 - 300 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Faza razvoja	Količina
YaraVita Brassitrel pro	u jesen	3 l/ha
YaraVita Bortrac + YaraTera MgS	u jesen	1 l/ha + 1 kg/ha
Novalon 20:20:20 + Bioplex + Trazex	pri kretanju vegetacije u proleće	5 kg/ha + 1-3 kg/ha + 250- 500 ml/ha
YaraVita Brassitrel pro + YaraVita Bortrac	pri kretanju vegetacije u proleće	3 l/ha + 1 l/ha

Đubrenje duvana

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	osnovna obrada ili pred rasađivanje	200 - 300 kg/ha
Granu Potasse	u proleće, pre faze intenzivnog porasta	100 - 300 kg/ha

Prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraTera Unika Kali	40 - 70 dana nakon rasađivanja	2 x 50 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraVita Universal Bio	u intenzivnom porastu	5 l/ha
Bioplex	u intenzivnom porastu ili u slučaju nepovoljnih uslova	0,5 l/ha

Đubrenje krompira

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	osnovna obrada ili pred setvu	400 - 500 kg/ha
YaraMila Elios 13:11:2	osnovna obrada ili pred setvu	300 - 500 kg/ha

Prihrana i folijarno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraTera Unika Kali + YaraLiva Nitrabor + Trazex + Bioplex	prvo zagrtanje, posle formiranje krtola, sa zaštitom	100 kg/ha + 200-300 kg/ha + 2x1 kg kg/ha + 2 l/ha
YaraVita KombiPhos	u fazi intenzivnog formiranja krtola	3 l/ha

Đubrenje luka

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex ili YaraMila Elios 13:11:2	osnovna obrada ili pred setvu	200 - 250 kg/ha
YaraMila Complex ili YaraMila Elios 13:11:2	faza 3-9 listova	100 - 150 kg/ha

Prihrana i folijarno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraLiva Nitrabor + YaraTera Unika Kali	formiranje glavice, razvoj glavice	150 kg/ha + 50-100 kg /ha
YaraVita Universal Bio	u fazi intenzivnog porasta	3-5 l/ha
Bioplex	u fazi intenzivnog porasta	500 ml/ha

Đubrenje lubenice i dinje

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	startno đubrenje u pripremi	500 - 800 kg/ha

Prihrana granulisanim đubrivima

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraLiva Nitrabor	faza cvetanja	200 kg/ha
YaraTera Unika Kali	od intenzivnog porasta do zrenja	100 kg/ha

Prihrana sistemom kap po kap

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12-48-6 + Rootex	prvih 14 dana nakon rasađivanja	do 0,5 kg/ nedelji/100m ² + 0,2/100 m ²
Novalon 19-6-20 + Bioplex	nakon 20 dana od rasađivanja	do 1,0 kg/nedelji /100 m ² + 0,05 l/100 m ²
Novalon 10-10-40	od intenzivnog porasta do zrenja	do 0,8 kg/nedelji /100 m ²
Novalon 12:48:6 + Rootex	prvih 14 dana nakon rasađivanja	do 0,5 kg/nedelji /100m ² + 0,2/100 m ²
Novalon 19:6:20 + Bioplex	nakon 20 dana od rasađivanja	do 1,0 kg/nedelji /100 m ² + 0,05 l/100 m ²
Novalon 10:10:40	od intenzivnog porasta do zrenja	do 0,8 kg/nedelji /100 m ²

Đubrenje paprike

Ishrana paprike granulisanim đubrivima na otvorenom

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex ili YaraMila Elios 13:11:2 ili YaraMila 8:20:28	startno đubrenje u pripremi	400 - 600 kg/ha
YaraLiva Nitrabor	intenzivni porast, cvetanje, zmetanje	250 - 300 kg/ha
YaraTera Unika Kali	cvetanje i razvoj plodova	100 - 200 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraVita Stopit ili YaraVita Caltrac	cvetanje i razvoj	5 l/ha ili 3 l/ha
YaraVita Bortrac	prvih 14 dana nakon rasađivanja do prve cvetne grane	3 l/ha
Bioplex	u fazi intenzivnog porasta ili u slučaju nepovojnih uslova	2 x 0,5 l/ha
YaraVita Universal Bio	u fazi intenzivnog porasta	3 x 3-5 l/ha

Ishrana sistemom kap po kap na otvorenom

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12-48-6	nakon sadnje	30 - 40kg/ha
Novalon 19-6-20	intenzivni porast	25 - 35 kg/ha/ nedelji
Novalon 15-5-35	cvetanje i zmetanje	30 - 40 kg/ha/ nedelji
Novalon 10-10-40	razvoj plodova	30 - 50 kg/ha/ nedelji
Novalon 10-10-40	zrenje i berba	25 kg/ha

Ishrana paprike granulisanim đubrivima u zaštićenom prostoru

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	startno đubrenje u pripremi	4-8 kg/100 m ²
YaraLiva Nitrabor	startno đubrenje u pripremi	2-4 kg/100 m ²
YaraTera Calcinit	nakon sadnje do kraja razvoja plodova	100-250 g/100 m ²

Ishrana sistemom kap po kap u zaštićenom prostoru

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12-48-6	nakon sadnje	400 g/nedelji /100 m ²
Novalon 19-6-20	intenzivni porast	250-450 g/nedelji /100 m ²
Novalon 15-5-35	cvetanje i zmetanje	450-650 g/nedelji /100 m ²
Novalon 10-10-40	razvoj plodova	750-1100 g/nedelji /100 m ²
Novalon 10-10-40	zrenje i berba	1100 g/nedelji /100 m ²

Đubrenje paradajza

Ishrana useva granulisanim đubrivima na otvorenom

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	startno đubrenje u pripremi	300 - 500 kg/ha
YaraLiva Nitrabor	intenzivni porast	250 kg/ha
YaraTera Unika Kali	cvetanje, zmetanje i razvoj plodova	100 - 200 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraVita Stopit ili YaraVita Caltrac	cvetanje i razvoj	5 l/ha ili 3 l/ha
YaraVita Bortrac	prvih 14 dana nakon rasađivanja do prve cvetne grane	1-2 l/ha
Bioplex	u fazi intenzivnog porasta ili u slučaju nepovojnih uslova	2 x 0,5 l/ha
YaraVita Universal Bio	u fazi intenzivnog porasta	2-3 x 3-5 l/ha

Ishrana sistemom kap po kap na otvorenom

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12-48-6	nakon sadnje	30-50 kg/ha
Novalon 19-6-20	intenzivni porast	25-35 kg/ha/ nedelji
Novalon 15-5-35	cvetanje i zmetanje	35-50 kg/ha/ nedelji

Đubrenje krastavca kornišona

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	neposredno pre rasađivanja	300 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12:48:6 + Rootex	od rasađivanja do cvetanja	do 0,7 kg/ nedelji/100m ² + do 0,5 kg/100m ²
Novalon 19:6:20 + Bioplex	prve berbe	do 1,2 kg/ nedelji/100m ² + do 0,02 kg/100m ² 2-3 puta
Novalon 15:5:35 + Bioplex	berba (maksimalno plodonošenje)	do 1,2 kg/ nedelji/100m ²
Novalon 19:6:20	berba (slabiji intenzitet)	200 g/ nedelji/100m ²

Ishrana sistemom kap po kap u zaštićenom prostoru

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12-48-6	nakon sadnje	40-50kg/ha
Novalon 19-6-20	intenzivni porast	30-50 kg/ha/ nedelji
Novalon 15-5-35	cvetanje i zametanje	35-50 kg/ha/ nedelji
Novalon 10-10-40	razvoj plodova	40-50 kg/ha/ nedelji
Novalon 10-10-40	zrenje i berba	40-50 kg/ha/ nedelji

Đubrenje kupusnjača

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	startno đubrenje u pripremi	300-500 kg/ha
YaraMila Elios 13:11:2	sa pripremom pre sadnju	100-300 kg/ha
YaraLiva Nitrabor	4-6 listova, početak razvoja rozete	250-500 kg/ha
YaraTera Unika Kali	4-6 listova, početak razvoja rozete	100-200 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12:48:6 + Bioplex	nakon ukorenjavanja	0,2 % rastvora folijarno + 0,25 l/ha
YaraVita Bortrac + YaraVita Stopit	moгу se primenjivati sa pesticidima	2-3 l/ha + 5 l/ha

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 10-10-40	razvoj plodova	30-50 kg/ha/ nedelji
Novalon 10-10-40	zrenje i berba	25 kg/ha
Novalon 12:48:6	nakon sadnje	30-50 kg/ha
Novalon 20:20:20	intenzivni porast	25-35 kg/ha/ nedelji
Novalon 15:5:35	cvetanje i zametanje	35-50 kg/ha/ nedelji
Novalon 10:10:40	razvoj plodova	30-50 kg/ha/ nedelji
Novalon 10:10:40	zrenje i berba	25 kg/ha

Ishrana sistemom kap po kap u zaštićenom prostoru

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12-48-6	nakon sadnje	400 g/ nedelji/100 m ²
Novalon 15-5-35	cvetanje i zametanje	500-700 g/ nedelji/100 m ²
Novalon 10-10-40	razvoj plodova	800-1200 g/ nedelji/100 m ²
Novalon 10-10-40	zrenje i berba	1100 g/ nedelji/100 m ²
Novalon 12:48:6	nakon sadnje	400 g/ nedelji/100 m ²
Novalon 15:5:35	cvetanje i zametanje	500-700 g/ nedelji/100 m ²
Novalon 10:10:40	razvoj plodova	800-1200 g/ nedelji/100 m ²
Novalon 10:10:40	zrenje i berba	1100 g/ nedelji/100 m ²

Đubrenje krastavca salata

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	neposredno pre rasađivanja	300 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12:48:6 + Rootex	prvih 14 dana nakon rasađivanja	do 0,7 kg/ nedelji/100m ² + do 0,5 kg/100m ²
Novalon 19:6:20 + Bioplex	nakon 20 dana od rasađivanja	do 1,2 kg/ nedelji/100m ² + do 0,02 kg/100m ² 2-3 puta
Novalon 15:5:35	od intenzivnog porasta do zrenja	do 1,2 kg/ nedelji/100m ²
YaraVita Universal Bio	od intenzivnog porasta do zrenja	3-5 l/ha
YaraVita Caltrac	od intenzivnog porasta do zrenja	3 l/ha

Đubrenje zelene salate

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	startno đubrenje u pripremi	200-400 kg/ha

Đubrenje sistemom kap po kap

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12:48:6 + Rootex	prva nedelja	do 0,3 kg/ nedelji/100m ² + do 0,5 kg/100m ²
Novalon 19:6:20 + Bioplex	druga i treća nedelja	do 0,5 kg/ nedelji/100m ² + do 0,05 kg/100m ²
Novalon 15:5:35	do branja	do 0,8 kg/ nedelji/100m ²
Novalon 12-48-6	prva nedelja	do 0,3 kg/ nedelji/100m ² + do 0,5 kg/100m ²
Novalon 19-6-20 + Bioplex	druga i treća nedelja	do 0,5 kg/ nedelji/100m ² + do 0,05 kg/100m ²
Novalon 10-10-40	do branja	do 0,8 kg/ nedelji/100m ²

Folijarno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 20:20:20	sa pesticidima	3-6 kg/ha
YaraVita Bortrac	sa pesticidima	2-3 l/ha
YaraVita Stopit	sa pesticidima	5 l/ha

Đubrenje mrkve, celera i peršuna

Osnovno đubrenje i prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Elios 13:11:2	sa osnovnom obradom	200-400 kg/ha
YaraMila Complex	sa pripremom pred sadnju	200-400 kg/ha
YaraLiva Nitrabor	od faze 6-8 listova do rozete	250-500 kg/ha
YaraTera Unika Kali	od faze 6-8 listova do rozete	100-200 kg/ha

Folijarno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraVita Stopit	sa pesticidima	5 l/ha

Đubrenje jagode

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	sa pripremom pred sadnju	500 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Rootex	15-20 dana nakon sadnje u jesen	do 300 g/ nedelji/100m ²
Novalon 10:10:40 + Bioplex	cvetanje	do 150 g/ nedelji/100m ² + do 0,5 l/100m ²
Novalon 10:10:40 + YaraLiva Calcinit	početak berbe	do 150 g/ nedelji/100m ² + do 100 g/ nedelji/100m ²
Dve nedelje pred kraja berbe prekinuti prihrane		

Đubrenje maline

Osnovno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	tokom marta meseca	500-700 kg/ha
YaraLiva Nitrabor	od početka do kraja cvetanja	250 kg/ha

Folijarna prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraVita Caltrac ili YaraVita Stopit + YaraVita Universal Bio + Bioplex	u proleće	3 l/ha ili 5 l/ha + 5 l/ha + 0,5 l/ha
YaraVita Stopit + YaraVita Universal Bio	cvetanje/berba	5 l/ha + 5 l/ha
YaraVita Bortrac + YaraVita Mantrac + YaraVita Zintrac	posle berbe	2 l/ha + 0,5 l/ha + 0,5 l/ha
Kasnije nastaviti samo sa vodom prema potrebi		

Đubrenje jabučastog voća

Osnovno đubrenje i prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex ili YaraMila Elios 13:11:2	posle berbe a pre opadanja lista	150 - 300 kg/ha
YaraMila Complex	startno đubrenje u rano proleće	250 - 500 kg/ha
YaraLiva Nitrabor	cvetanje	250 - 400 kg/ha
YaraTera Unika Kali	od početka cvetanja do kraja intenzivnog rasta	100 - 200 kg/ha

Folijarno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraVita Bortrac	sazrevanje	2-6 l/ha posle berbe
YaraVita Zintrac + YaraVita Mantrac pro	u jesen folijarno posle berbe a pre opadanja lista i T faza ploda	1-3 l/ha + 1-3 l/ha
YaraVita Stopit	od početka cvetanja do završnih faza zrenja	5-10 l/ha od početka cvetanja + 5l/ha do kraja zrenja

Đubrenje nadovnjavanjem kap po kap

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
Novalon 12:48:6	pojava pupoljaka	2-3 g/stablu nedeljno
Novalon 20:20:20	precvetavanje, stvaranje plodova i nakon berbe	15-20 g/stablu nedeljno
Novalon 19:6:20	precvetavanje, stvaranje plodova	7-9 g/stablu nedeljno
Novalon 12-48-6	startno đubrenje u rano proleće	50 kg/ha
Novalon 15-5-35	cvetanje	30-50 kg/ha
Novalon 10-10-40	T-faza ploda, intenzivni rast maj/jun	30-50 kg/ha
Novalon 10-10-40	razvoj ploda tokom letnjih meseci i pupanje jul/avgust	30-50 kg/ha
Novalon 10-10-40	pred zrenje	30-50 kg/ha

Đubrenje koštičavog voća

Osnovno đubrenje i prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex ili YaraMila Elios 13:11:2	nakon berbe	150 - 250 kg/ha
YaraMila Complex	startno đubrenje u rano proleće	250 - 500 kg/ha
YaraLiva Nitrabor	od početka pupanja do pred zrenje	150 - 300 kg/ha u dva tretmana

Folijarno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraVita Bortrac	u jesen folijarno posle berbe a pre opadanja lista i u fazi pupanja	2-4 l/ha u jesen i 1-2 l/ha pojava pupoljaka
YaraVita Zintrac + YaraVita Mantrac pro	u jesen folijarno posle berbe a pre opadanja lista i u fazi razvoja ploda do promene boje	1-2 l/ha + 1-2 l/ha
YaraVita Stopit ili YaraVita Caltrac	od početka cvetanja do završnih faza zrenja	3- 5 l/ha u 1 ili 2 tretmana

Đubrenje vinove loze

Osnovno đubrenje i prihrana

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraMila Complex	startno đubrenje u jesen ili proleće	100 - 300 kg/ha
YaraLiva Nitrabor	faza 2-3 lista	100 - 200 kg/ha
YaraTera Unika Kali	pred cvetanje do pred razvoj bobica	50 - 100 kg/ha

Folijarno đubrenje

Đubrivo/formulacija	Vreme primene	Količina
YaraVita Stopit	od početka razvoja bobica do kraja faze promene boje	5-8 l/ha u 2 ili 3 tretmana
YaraVita Bortrac	pred cvetanje i nakon berbe	1-2 l/ha pred cvetanje i 2-4 l/ha nakon berbe



Poljoprivredna mehanizacija



agrimatco

 **POTTINGER**



Tecnoma 

Kompanija POTTINGER se od osnivanja porodične manufakture 1871. razvila u jednog od vodećih proizvođača poljoprivredne mehanizacije.

U avgustu 2021. POTTINGER je proširio svoj postojeći asortiman pneumatskim sejalicama za okopavine akvizicijom sa italijanskim proizvođačem Mattermac-om. Više od 90% proizvodnog programa se izvozi na tržište celog sveta

Cilj kompanije je da obezbedi izvanredne radne rezultate a da pri tome obezbedi održivo poslovanje svojih kupaca.

U portfoliju naših proizvoda možete naći sve mašine za obradu zemljišta i mašine za setvu. Ono što bismo želeli da izdvojimo iz ove široke palete proizvoda su žitne sejalice, gruberi i plugovi.

SERVO 25 i 35 nošeni plugovi obrtači za traktore od 120ks omogućuju brzo i snažno prilagođavanje pluga različitim modelima traktora čime obezbeđuje laku vuču uz efikasnu

uštedu goriva. Robusna i inteligentna konstrukcija plugova Pottinger omogućava optimalnu raspodelu sila otpora i naprezanja koji se javljaju pri radu.

Gruberi serije SYNKRO koncipirani su za obradu strništa, kao i za osnovnu dubinsku obradu i za dopunsku površinsku obradu zemljišta. Fina podešavanja daju perfektno rezultate rada i produktivnost uz maksimalne uštede. Hidraulično podešavanje dubine obezbeđuje idealan rad za različite uslove rada i različite tipove zemljišta.

Pouzdana tehnika u kombinaciji sa praktičnim rešenjima lakim za korišćenje odlikuje najnoviju generaciju sejalica **VITASEM**. Zahvaljujući različitim izvedbama ulagača semena obezbeđuje se kvalitetna setva i ravnomerna dubina u svim uslovima rada. Različiti dodaci poput pritisnih točkova **FARMFLEX** kao i **COMPASS** kontrole čine ovaj agregat perfektnim za naše tržište.





RAUCH

RAUCH je jedan od vodećih svetskih proizvođača rasipača mineralnog đubriva kao i rasipača soli. RAUCH jedna od retkih kompanija koja ulaže u konstantan razvoj svojih proizvoda, sa svojim preciznim sistemima EMC kao i SPEED SERVOS se potpuno razlikuje od drugih.

RAUCH proizvodi garantuju najveću preciznost, brzinu i maksimalnu udobnost rada.

Trenutno u svom programu imaju sledeće mašine:

- MDS 8.2; MDS 14.2; MDS 18.2; MDS 20.2; - Kompaktni rasipači sa mehaničkim pogonom
- AXIS M 20.2 EMC (ili EMC+W); AXIS M 30.2 EMC (ili EMC+W); AXIS M 50.2 EMC+W;
- Rasipači sa mehaničkim pogonom
- AXIS H 30.2 EMC (ili EMC+W); AXIS H 50.2 EMC+W; - Rasipači sa hidrauličnim pogonom
- AXEN.T – Vučeni rasipači za velike površine.
- TWS 85.1 – Vučeni rasipač modularnog tipa

Trenutno najtraženiji proizvod predstavljaju vrhunski rasipači AXIS M 30.2 EMC + W, Varispread pro, sa ISOBUS-om, jer je EMC sistem koji dolazi od RAUCH-a najpouzdanija precizna tehnika koja Vam obezbeđuje rasipanje u gram, najbži odziv u svojoj klasi, aktivni sistem merenja, kao i bez stepeni sistem sekcija, sa svojim SPEED SERVOS aktuatorima kojima prašina i vlaga ne mogu ništa.

JACTO

Najveća fabrika prskalica na svetu koja se nalazi u Brazilu. Sa svojim proizvodnim programom pokriva kompletnu gamu mašina za zaštitu ratarskih useva, dugogodišnjih zasada kao i malih hobi rešenja. JACTO je tradicionalno povezan sa Japanom obzirom na vlasničku strukturu, i kao takav sadrži perfektan pristup u svakom segmentu proizvodnje kao i korišćenja svojih mašina. Inovator u svetu prskalica sa svojom specijalnom divizijom za preciznu poljoprivredu i sopstvenim brendom OTMIS. U svom proizvodnom programu ima sledeće proizvode:

- Samohodne ratarske prskalice
- Vučene i nošene ratarske prskalice sa i bez vazdušne podrške
- Atomizeri, nošenog i vučenog tipa
- Mala hobi rešenja (leđne prskalice itd.)



Trenutno najsavremeniji i najviše zastupljen proizvod u JACTO proizvodnji je UNIPORT 3030, samohodna prskalica za ratarstvo sa dvostrukim radnim klirensom 1,5m i 1,8m sa hidrostatskom transmisijom i dvostrukom hemijskom pumpom JP 300 sa keramičkim hilznama. Ovaj jedinstvena prskalica poseduje najsavremenije hemijsko kolo otvorenog tipa sa povratnom spregom, kontrolom prskanja dizna po dizni, ugrađenim GPS uređajem sa RTX tipom korekcije, hidrauličnim podešavanjem razmaka između točkova i visinom dizanja krila od 2,7m, i to sve u standardu.



CHECCHI AND MAGLI

Kompanija CHECCHI AND MAGLI je osnovana davne 1976 godine u Budriju, Italija, pokrajina Bolonja, gde joj se i danas nalazi sedište sa tri proizvodna postrojenja. Dugogodišnje iskustvo i tradicija ove kompanije ogledaju se pre svega u proizvodnji mašina za sadnju (sadicica) za povrće, duvan i ostale kulture koje se rasađuju. Svetski je lider, a od svih italijanskih proizvođača se izdvaja svojim patentiranim mehanizmima. Izvozi 80% svoje proizvodnje. Proizvodna gama se završava mašinama za uzgoj, kultivaciju i vađenje krompira (sadicice krompira, vadicice i vibro vadicice) od kojih je ova kompanija i počela, preko mašina za formiranje bankova i postavljanje folija za uzgoj na mulch foliji (jagode, lubenice, dinje itd.). Ove visokokvalitetne mašine za intenzivnu industrijsku proizvodnju, sa visokoproduktivnim učinkom i malim troškovima održavanja, dostupne su kod nas u Srbiji i za male farmere.



ESCORTS grupa je među vodećim indijskim proizvodnim konglomeratima, i posluje sa velikim uspehom u sferi poljoprivrednih mašina, građevinskih mašina i opreme, opreme za železnice i komponentama za auto industriju. U okviru sektora za poljoprivrednu mehanizaciju ESCORTS LTD. je započeo proizvodnju 1961. godine, i od tada je korišćenjem sopstvenog iskustva i stručnosti ostvario značajan uticaj na promene u poljoprivrednoj proizvodnji, širom sveta. Ovi traktori značajno su doprineli prvoj zelenoj revoluciji u Indiji. ESCORTS je među najvećim proizvođačima traktora u Indiji, i jedan od deset najvećih svetskih proizvođača, sa 1,5 miliona traktora proizvedenih od 1961. godine.

FARMTRAC traktori su ekonomični, pouzdani i perfektni za radove oko gazdinstva. Sa rasponom snage od 20-130 KS u opcijama sa pogonom na dva ili na sva četiri točka. Naši traktori sa većom snagom opremljeni su svetski priznatim motorima marke PERKINS, i transmisijama marke CARRARO.

Jedina indijska kompanija koja ima proizvodni pogon u Evropi, FARMTRAC Tractors – Europe. Prisutni smo na tržištu Poljske više od 17 godina. Naši traktori bili su nagrađivani više puta, uključujući i prestižnu nagradu „Poljoprivredna mašina godine“ za model traktora Farmtrac 675 DT.

FARMTRAC je vodeći brend traktora, prisutan u 62 zemlje, služeći poljoprivrednicima u Evropi, Aziji, Africi i Americi. Zadovoljavaju poslednje standarde po pitanju emisijih normi, Stage 3A, Stage 3B, Stage 4, Stage 5.

COMPACT SERIJA

Kompaktan stil, višenamenski koristan



- Dostupan u 20KS, 22KS, 26KS, 30KS.
- 3-cilindrični snažan Mitshubishi motor.
- Tehnologija transmisije sa konstantnim zupčanjem sa 9 brzina za hod unapred + 3 brzine za hod unazad
- Opcija 3-stepene hidrostatske transmisije
- Uski profil i mali radijus okretanja
- Različite opcije točkova npr. za poljoprivredu, za travnjake, industrijske ili radijalne

NETS SERIJA

Bez premca višenamenski, bez paralele u pouzdanosti



- Dostupan u varijanti 45KS i 50KS, sa pogonom na dva i četiri točka
- 3 Cilindra, ekonomičan motor sa velikim obrtnim momentom
- 8 brzina za hod unapred + 8 brzina za hod unazad sa P/Z sinhronim reverzerom
- Priključno vratila sa dve brzine
- Ravna platforma sa širokim pristupom
- Odličan radijus okretanja

NARROW SERIJA

Tehnologija visokih performansi, fenomenalan u voćnjacima i viogradima



- Dostupan u varijanti 75 KS
- Motor sa 74,5 KS, obrtnim momentom i boljom uštedom goriva
- Konstrukcija sa niskim profilom kao i uskim tragom točkova (širina samo 1450 mm)
- Štiti voćke i lisnu masu
- Sinhronizovana transmisija sa reverzerom (12 brzina napred + 12 brzina nazad, sa puzajućom transmisijom)
- Snažan podizni sistem u 3 tačke sa većim kapacitetom
- Opciona kabina sa HVAC / grejno - ventilacionim uređajem

FARMTRAC traktori se mogu pohvaliti jednostavnim, pouzdanim dizajnom, niskom potrošnjom kao i malim troškovima održavanja. Ovi traktori se sklapaju od svetski poznatih komponenti uključujući PERKINS motore, CARRARO transmisiju kao i komponente od BOSCH, MITA i drugih renomiranih kompanija. Osiguravaju trajnost i pouzdanost traktora čak i u teškim uslovima i terenima

TECNOMA

Brend TECNOMA je nastao davne 1952 godine kako bi približio praktična rešenja u zaštiti bilja profesionalnim poljoprivrednim proizvođačima. Od tada je kompanija otkrila nekoliko inovativnih rešenja, koja i dan danas ne prestaju. Glavna je pokretačka snaga EXEL grupe koja je nastala iz TECNOM-a kompanije. TECNOMA sa svojim velikim brojem patenata i novih proizvoda svedoči o inovativnoj vrednosti i zbog toga zauzima primat u grupaciji. Ovaj proizvođač u svom proizvodnom programu ima samohodne, vučene i nošene prskalice za ratarstvo, kao i atomizere za voćarstvo i vinogradarstvo. Svojim rešenjima VARIOSELECT, AXAIR, TECFLOW, O'CLEAR, TOPFIELD II, DPAE+ AGP, OSS+, PENTIX i ostalima, kao i ISO BUS i I.N.C.S sistemima predstavlja najsavremenije tehnološko rešenje koje se danas može videti u tehnici primene pesticida.



Ogledno polje

Ogledna stanica „Agrimatco“ nalazi se u Čelarevu, 35 km udaljena od Novog Sada (put Čelarevo-Gajdobra). Ogledno polje je osnovano 2002. godine, površine 4 ha, sa 2000 m² zaštićenog prostora i voćnjakom. Ogledno polje ima za cilj da se u klimatskim uslovima našeg područja svake godine ispi-ta veliki broj novih hibrida povrtnarskih vrsta koji se kasnije uvode u proizvodnju na na-šem tržištu. Pored ogleda sa ratarskim i po-vrtnarskim kulturama primenjuju se savre-mene tehnologije zaštite bilja u proizvodnji na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, sa i bez navodnjavanja. Iskustvo kroz rad na oglednom polju nam omogućava da svim proizvođačima damo koristan i pravi savet za postizanje što boljih rezultata.

Ogledno polje je otvoreno tokom cele vege-tacione sezone, a Dane Polja organizujemo početkom jula, sredinom avgusta i početkom oktobra, kako bi se proizvođači što bolje upoznali sa našim hibridima i videli sve što je novo u ponudi za naše tržište.

Svako ko je zainteresovan biće naš rado vi-đen gost. Dođite i posetite nas.





agrimatco

U službi
generacija
poljoprivrednika

agrimatco.rs

Komercijalno-stručni predstavnici na terenu

Blagoja Đurković, 063/594 934
Menadžer za ključne kupce

Vesna Rajčić, 063/86 13 497
Regionalni menadžer za Vojvodinu

Milan Bogdanović, 063/432 067
Regionalni menadžer za centralnu Srbiju

 Vesna Rajčić, 063/86 13 497

 Zoran Popov, 063/371 962

 Jana Petraš, 063/432 079

 Milan Bogojević, 063/521 392

 Suzana Đurak Filipović, 063/432 247

 Milan Bogdanović, 063/432 067

 Dajana Dardić, 063/371-773

 Davor Stakić, 063/635 320
za program semena povrtnarskih biljaka

 Nataša Đermanović, 062/603-327
za program semena povrtnarskih biljaka

 Jovan Živić, 063/687 738

 Jovana Gašić, 063/432 280

 Stefan Krsmanović, 063/432 310

 Dragana Janjić, 063/371 758

 Nikola Petrović, 063/633 267

 Branko Živković, 063/432 140
za program semena povrtnarskih biljaka

 Dalibor Đurić, 063/433 225
za program semena povrtnarskih biljaka

 Jovana Jevrić, 063/432-996
za program semena povrtnarskih biljaka

 Bratislav Bata Cvetković, 063/371 765
za program semena povrtnarskih biljaka

Program semena ratarskih biljaka:
Alfred Nemet, 063/371 993

**Program semena
povrtnarskih biljaka:**
Zoran Džilić, 063/432 131

Mineralna đubriva:
Igor Palamarčuk, 063/433 546


Pesticidi:
Dušan Belenzada, 063/432 133

Navodnjavanje:
Dušan Milovanović, 063/297 159

Veterina:
Vesna Savić Solomun, 063/10 16 973

Poljoprivredna mehanizacija:
Boris Ljubičić, 063/432 138
Savo Stojanović, 063/652 392
Miloš Milinković, 063/432 780

Direktor prodaje:
Milan Popović, 063/508 664



agrimatco

21102 Novi Sad
Narodnog fronta 73/I, POB 8
Tel: 021/469-629,
021/469-580,
021/466-365
agrimatco.serbia@agrimatco-eu.com
www.agrimatco.rs